



**INFORME SEMANAL SOBRE SITUACIÓN DEL CAMPO**  
Semana nº 36 - Del 2 al 9 de septiembre de 2011

**1- CLIMA Y SUELO**

LLUVIA (Inferior a normal, Normal, Superior a normal)

INFERIOR A NORMAL

TEMPERATURA (Inferior a normal, Normal, Superior a normal)

NORMAL

INFLUENCIA SOBRE LOS CULTIVOS (Beneficiosa, Nula, Perjudicial)

NULA

Ésta viene determinada por el clima (lluvia y temperatura)

SUELO (Muy seco, Seco, Normal, Húmedo, Muy húmedo)

MUY SECO

**2. SITUACIÓN DE LOS CULTIVOS**

	Cosecha (1)	Situación (2)	Previsiones cosecha (3)
CEREALES REGADÍO (Maíz, arroz)	N	2	N
LEGUMINOSAS	--	--	--
PATATAS	N	2	N
OLEAGINOSAS (Colza, girasol)	N	2	N
HORTALIZAS	N	2	N
FRUTALES	A	2	N
VIÑEDOS	A	2	N
OLIVAR	A	2	N
PRADOS Y FORRAJES	N	2	N

(1) A: Adelantada, N: Normal, R: Retrasada. (2) 1: Mala, 2: Normal, 3: Buena. (3) +N: Superior a normal, N: Normal, -N: Inferior a normal

**3. SIEMBRA, PLANTACIÓN Y RECOLECCIÓN**

SIEMBRA Y PLANTACIÓN	Condiciones (1)	RECOLECCIÓN (2)	Rendimiento (3)
Crucíferas.	B	Girasol. Forraje. Alfalfa. Maíz forrajero.	N
Ensalada IV Gama.	B	Calabacín. Pochas. Maíz dulce. Berenjena. Tomate conserva. Alubia verde industria. Pimiento. Cebolla. Tabaco.	N
		Pera. Nectarina. Melocotón. Manzana. Endrino.	N
		Invernadero: lechuga, escarola, borraja. Hortalizas "baby leaf". Ensaladas IV gama. Tomate. Pepino. Alubia verde. Pimiento verde.	N

(1) Condiciones en las que se está realizando la siembra y plantación: B: Buenas, R: Regulares, M: Malas. (2) Cultivos en recolección.

(3) Rendimiento esperado. I: Inferior, N: Normal, S: Superior, siendo N el rendimiento medio de la provincia.

**4. DAÑOS**

ZONAS Y CULTIVOS AFECTADOS	AGENTE PRODUCTOR (Helada, sequía, inundación, incendio, ...)	CONSECUENCIAS (1)

(1) L: Leve, G: Grave, MG: Muy Grave



## 5.- OBSERVACIONES

# La Recolección de tomate para conserva está en su punto álgido

### Climatología

El periodo comprendido entre el 2 y el 9 de septiembre se ha caracterizado por la estabilidad climática. Los días soleados han ocupado toda la semana y las temperaturas, tanto diurnas como nocturnas, han ido subiendo a medida que transcurrían los días, llegando en los últimos días a valores más propios de agosto. Por otro lado, las precipitaciones siguen ausentes, y salvo alguna tormenta muy localizada en algún paraje de la zona cantábrica o pirenaica, no hay constancia de lluvias de importancia en el resto de la Comunidad.

Todo ello lleva consigo que en el secano esta situación se vaya agravando tanto en los cultivos de verano como en las praderas y pastizales. Por otro lado, en las tierras de labor, los barbechos no pueden ser laboreados de cara a la preparación del suelo para la próxima campaña de sementera cerealista.

Sin embargo, esta climatología, sobre todo por la ausencia de precipitaciones, es bien recibida en La Ribera, donde la campaña de recolección de cultivos de verano como los pimientos, algunos tipos de maíz y sobre todo el tomate de conserva, se ve muy favorecida cuando las lluvias pasan de largo.

### Cultivos de secano

Como queda dicho, cuando se va acercando el inicio de la nueva campaña cerealista y se debería trabajar sobre los rastros de la campaña pasada, la sequía está retrasando estas labores, que salvo en tierras suaves y frescas, desaconsejan su laboreo. Tampoco hacen acto de presencia los ricios y rebrotes de malas de hierbas, que deben ser eliminados antes de iniciarse las nuevas siembras.

En la Zona Media, así como en Tierra Estella y La Ribera, las típicas labores preparatorias como el labrado, gradeo y moloneado que se pudieron iniciar, se están haciendo con dificultad por el tempero tan poco adecuado, y en las zonas más norteñas, como la Cuenca de Pamplona y el Norte de Tierra Estella, los agricultores también están retrasando estas labores en espera de que alguna tormenta alivie la sequía y mejore las condiciones del suelo.

En el caso de la **colza**, cuya campaña de siembra se sitúa generalmente en esta primera quincena de septiembre, se está viendo retrasada ante la reticencia de los agricultores a sembrar en seco por los resultados poco positivos que se consiguen en la nascencia.

En las Comarcas I y II, donde el **maíz forrajero** había adquirido un porte importante y se esperaba que con el llenado de las mazorcas culminara una buena campaña de forraje, que aliviara las penurias de los ganaderos, la prolongada sequía, y sobre todo en estas etapas críticas, puede hacer peligrar su maduración y los buenos rendimientos.

Se sigue recolectando el **girasol** en buenas condiciones, pero los buenos resultados que apuntaba el cultivo, hasta mediados de verano, también se están viendo afectados por un pobre llenado de las pipas, como consecuencia de las deficiencias hídricas que padeció el cultivo de secano en los últimos fases de su fenología.

### Ganadería y praderas

Los calores que estamos padeciendo estos últimos días no hacen si no agravar el estado de agostamiento que padecen nuestros pastizales, donde ni siquiera los rocíos mañaneros logran una mínima brotación de hierba.

### Cultivos de regadío

En este sector la ausencia de lluvias no tiene la trascendencia que tiene en el secano; y en estas fechas de recolección de los cultivos de verano, la ausencia de lluvias es bienvenida por lo que facilita las labores propias de la recolección.

En la Comarca VII, la zona de Ribaforada, Fustiñana, Cortes y sobre todo Buñuel, las tormentas y granizo de la semana pasada afectaron a los cultivos en pie donde los daños parecen ser considerables en algunos parajes, la actividad va volviendo a la normalidad y la recolección, principalmente de tomate para conserva y alfalfa, ya se ha reanudado.



## Siembras y plantaciones

Esta semana ha finalizado la siembra de otoño de **espinaca para la congelación**. Las zonas en las que más superficie se ha dedicado a este cultivo se encuentra en los nuevos regadíos de Artajona, Miranda de Arga y Mendigorria donde alcanzan las 100 has, le sigue Cortes con 50 y en la zona de Funes con 25 has.

En cuanto a las **crucíferas**, se siguen con los programas de plantación que establecen las industrias congeladoras. Se continúan plantando parcelas, principalmente de brócoli, a la vez que las más tempranas muestran un buen desarrollo con un ligero adelanto vegetativo.

## Recolección

Se está en plena campaña de picado de **maíz forrajero**. Las máquinas tiene abiertos varios frentes de trabajo, en Villafranca, Comarca VII y Marcilla; pronto pueden empezar en las Comarcas I y II. Los rendimientos están siendo altos, aunque el cultivo ha sufrido ataques de cierta importancia tanto de taladro como de araña roja.

El **maíz dulce** también se encuentra en plena recolección en la zona de Valdizarbe. Las producciones también están dentro de las habituales.

El corte de planta de **tabaco**, reducido a la zona de Genevilla y Murieta, prácticamente ha finalizado con una buena producción de hoja. Ahora se procede al colgado para su secado y curación.

En esta zona se sigue con la recolección de **pocha** para el mercado fresco. A la producción de la campaña, que está siendo buena, no le acompañan los precios que alcanza la venta del producto, que además se ve afectado por fuertes e imprevistas oscilaciones.

La recolección de la **pocha para congelar** se iniciará la semana que viene en las parcelas de Villafranca.

Mientras que en Funes ya finalizó la recolección de **calabacín**, se sigue cortando en parcelas de Cadreita, Valtierra, Bardenas, etc. La campaña ha sido irregular, mejorando a medida que ésta avanzaba.

En la zona de Funes, como en el Valle del Aragón, se está cortando **pimiento del tipo California**, tanto del rojo como amarillo, para las congeladoras. El cultivo se ha visto algo afectado por los golpes de calor de mediados de agosto con la aparición de zonas soleadas, así como por ciertos ataques de taladro. La semana que viene se iniciara la recogida de variedades como Luesia y Cierzo.

La recolección de otros tipos como **pico piquillo**, salvo alguna cogida de limpia con destino al mercado fresco, está a la espera de una maduración más generalizada que induzca a la industria conservera al inicio de la actividad transformadora.

El grueso de la actividad recolectora en estas fechas lo ocupa el **tomate para conserva**. La recolección se encuentra en su punto álgido. Se han cosechado las variedades tempranas —Ercole, Gladis, Perfectpeel, H3405, etc.— son unos resultados buenos, algo inferiores respecto a los que se lograron las dos campañas pasadas, que fueron superiores a los habituales. Se detectaron algunos focos de taladro, que habiéndose tratado oportunamente, no deberían tener excesiva importancia, así como parcelas con culillo por deficiente aporte hídrico en periodos de máxima necesidad. En estas fechas se recolectan las segundas plantaciones y con un potencial productivo quizá más elevado. El cultivo, pasado la concentración de maduración que se produjo por los calores de agosto, va volviendo a su ritmo habitual y parece que la producción va en sintonía con la demanda y capacidad de transformación de las industrias.

La recolección de **alubia verde** para la industria continúa su programación. Se cosecharon las parcelas tempranas de la zona de Cortes con buenos resultados y en estas fechas se cosechan por Mendigorria y Artajona. En la segunda quincena las máquinas entrarán en las parcelas de la zona de Mélida y Santacara.

## Frutales

Se está a punto de finalizar la recolección de la variedad más cultivada de **pera**, la Conferencia. Los resultados han sido superiores a los del año pasado en cuanto a cantidad, pero algo más bajos de los habituales, aunque ha mejorado bastante el tamaño de los frutos.

En la **manzana**, ya se han recogido las Reinetas en su mayoría y ahora se recolectan las variedades de Golden. Las producciones y calibres están siendo buenos.

El **melocotón** ya ha entrado en su recta final con la recolección de las distintas variedades de amarillos de septiembre.

Los precios de la fruta, en general, siguen otro año más en unos niveles en los que el agricultor no ve recompensada su inversión y en algunos casos está pensando en el abandono o cambio de actividad.

Se están cosechando las variedades de ciclo medio de **endrino** con buenos rendimientos.