



VACUNACIÓN FRENTE AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

Revisada la evidencia disponible¹ sobre la estrategia de vacunación frente al VPH, se considera el paso de una pauta de 3 dosis a 2 dosis en personas de 15 a 26 años de edad, manteniendo la pauta de 3 dosis (0-2-6 meses) para las personas a partir de 26 años de edad y personas con inmunosupresión, quedando las diferentes indicaciones incluidas en el calendario de la siguiente forma:

- Vacunación VPH a los 11-12 años (niños y niñas): dos dosis de vacuna nonavalente (VPH-9) con una separación de 6 meses, a los 11-12 años. Esta vacunación se realizará en el ámbito escolar, en 6º de Educación Primaria (EP).
- Mujeres no vacunadas, que tengan hasta 26 años y no hayan sido inmunizadas previamente, así como niños no vacunados que hayan nacido a partir del 1 de enero de 2012. Pauta: Dos dosis con una separación de seis meses (0-6m).
- Vacunación a las personas con determinadas situaciones de riesgo.
 - o Mujeres con cualquier tratamiento de lesión intraepitelial de alto grado en cérvix. Pauta de 3 dosis (0-2-6 meses).
 - o Hombres que tengan sexo con otros hombres. Pauta de dos dosis (0-6 meses) hasta los 26 años y pauta de 3 dosis (0-2-6 meses) a partir de los 26 años de edad.
 - o Mujeres y Hombres en situación de prostitución. Pauta de dos dosis (0-6 meses) hasta los 26 años y pauta de 3 dosis (0-2-6 meses) a partir de los 26 años de edad.
- En personas con inmunosupresión se recomienda siempre la pauta de tres dosis (0-2-6 meses), independientemente de la edad de vacunación. Se incluyen:
 - o Síndrome WHIM: con vacuna que cubra los serotipos 6 y 11. (mujeres y hombres).
 - o Infección por VIH (mujeres y hombres).
 - o Trasplante de órgano sólido o de precursores hematopoyéticos (sólo mujeres).
 - o Enfermedades que requieran tratamiento con fármacos inmunosupresores (sólo mujeres).

Las personas que hayan iniciado pauta de vacunación y tengan administradas dos dosis, completarán la pauta con una 3ª dosis a los 6 meses de la primera dosis administrada.

¹ Grupo de trabajo de Recomendaciones de vacunación frente a VPH de la Ponencia de Programas y Registro de Vacunaciones. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema nacional de Salud. Ministerio de Sanidad. Noviembre de 2023

**Pauta de vacunación
(meses tras la 1ª dosis)**

0 2 m 6 m

Calendario Vacunaciones			
Vacunación VPH a los 11-12 años (niños y niñas)			
Catch-up			
Mujeres no vacunadas, hasta 26 años			
Niños nacidos a partir del 01/01/2012, no vacunados			
Vacunación a personas con determinadas situaciones de riesgo			
Hombres que tengan sexo con otros hombres (< 26 años)			
Hombres que tengan sexo con otros hombres (≥ 26 años)			
Mujeres y hombres en situación de prostitución (< 26 años)			
Mujeres y hombres en situación de prostitución (≥ 26 años)			
Mujeres con cualquier tratamiento de lesión intraepitelial de alto grado en cérvix			
Síndrome WHIM (mujeres y hombres).			
Infección por VIH (mujeres y hombres).			
Trasplante de órgano sólido o de precursores hematopoyéticos (sólo mujeres).			
Enfermedades que requieran tratamiento con fármacos inmunosupresores (sólo mujeres).			