

## ACTUALIZACIÓN DE LA VACUNACIÓN FRENTE AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

Revisada la evidencia disponible<sup>1</sup> sobre la estrategia de vacunación frente al VPH, se considera apropiado el paso de un esquema de dos dosis a un esquema de una dosis para las personas hasta los 25 años de edad, junto a otras estrategias de captación en el calendario de vacunaciones e inmunizaciones a lo largo de toda la vida para el año 2025. Por lo tanto, las recomendaciones de vacunación frente a VPH quedarían como sigue:

- Vacunación VPH a los 11-12 años (niños y niñas): Pauta de una dosis de vacuna nonavalente (VPH-9). Esta vacunación se realizará en el ámbito escolar, en 6º de Educación Primaria (EP). En el curso 2024-2025, se vacunarán con una única dosis los nacidos en 2013.
- Mujeres no vacunadas, menores de 26 años y no hayan sido inmunizadas previamente. Pauta: una dosis
- Varones nacidos en 2012, no vacunados con anterioridad. Pauta: una dosis. Los varones nacidos en 2012 que tuvieran una dosis previa administrada, no requieren la administración de una segunda dosis.
- Catch-up de varones no vacunados hasta los 18 años de edad (nacidos entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2011). Pauta: una dosis → ver documento *“Planificación de la vacunación frente al VPH en chicos (“catch-up”) durante los cursos escolares 2024-2025 y 2025-2026”*, disponible en:
  - AUZOLAN: <https://gcsalud.admon-cfnavarra.es/Salud04/INSP/informacion/vacunacion/Paginas/default.aspx>
  - WEB ISPLN:  
[http://www.navarra.es/home\\_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/Publicaciones/Publicaciones+profesionales/Epidemiologia/](http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Publica/Publicaciones/Publicaciones+profesionales/Epidemiologia/)
- Personas no vacunadas con determinadas situaciones de riesgo:
  - Hombres que tengan sexo con otros hombres. Pauta de una dosis hasta los 25 años y pauta de 2 dosis (0-6 meses) a partir de los 26 años de edad.
  - Mujeres y Hombres en situación de prostitución. Pauta de una dosis hasta los 25 años y pauta de 2 dosis (0-6 meses) a partir de los 26 años de edad.
- Mujeres de cualquier edad, que hayan recibido cualquier tratamiento por lesión intraepitelial de alto grado en cérvix (CIN 2+). Pauta de 3 dosis (0-2-6 meses). La vacunación se realizará preferentemente antes del tratamiento de la lesión o, si no es posible, cuanto antes después de finalizar el tratamiento

<sup>1</sup> Grupo de trabajo de Recomendaciones de Vacunación frente a VPH de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Actualización de las recomendaciones de vacunación frente a VPH. Revisión de la estrategia de una dosis. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, julio 2024

- Pauta de 3 dosis (0, 2 y 6 meses) en personas no vacunadas con inmunosupresión pertenecientes a los siguientes grupos de riesgo, independientemente de la edad de comienzo de la vacunación:
  - Síndrome WHIM: con vacuna que cubra los serotipos 6 y 11. (mujeres y hombres).
  - Infección por VIH (mujeres y hombres).
  - Trasplante de órgano sólido o de precursores hematopoyéticos, independientemente del estado previo de vacunación (mujeres y hombres).
  - Enfermedades que requieran tratamiento con fármacos inmunosupresores (sólo mujeres) y hasta los 45 años (incluidos).

	Pauta de vacunación (meses tras 1 <sup>a</sup> dosis)			Código pauta INMUNIS
	0	2 m	6 m	
<b>Vacunaciones de calendario</b>				
Vacunación VPH a los 11-12 años (niños y niñas).				C1D
Mujeres no vacunadas, menores de 26 años				CRM
Varones no vacunados, nacidos en 2012				CRH
<b>Catch-up</b>				
- Varones nacidos entre el 01 ene 2007 y el 31 dic 2011				CRH
<b>Vacunación a personas con determinadas situaciones de riesgo</b>				
- Hombres que tengan sexo con otros hombres (< 26 años)				GR1D
- Hombres que tengan sexo con otros hombres (≥ 26 años)				GR2D
- Mujeres y hombres en situación de prostitución (< 26 años)				GR1D
- Mujeres y hombres en situación de prostitución (≥ 26 años)				GR2D
<b>Mujeres de cualquier edad</b> , que hayan recibido cualquier tratamiento por lesión intraepitelial de alto grado en cérvix (CIN 2+).				GR3D
<b>Personas no vacunadas con inmunosupresión pertenecientes a los siguientes grupos de riesgo</b>				
- Síndrome WHIM (mujeres y hombres).				GR3D
- Infección por VIH (mujeres y hombres).				GR3D
- Trasplante de órgano sólido o de precursores hematopoyéticos (mujeres y hombres).				GR3D
- Enfermedades que requieran tratamiento con fármacos inmunosupresores (sólo mujeres) <b>hasta los 45 años (incluidos)</b>				GR3D