

EDITA

Departamento de Salud Gobierno de Navarra

IMPRESION

Trece Diseño Gráfico

Gráficas Alaiz

DEPOSITO LEGAL NA - 128/2002

DISEÑO-ILUSTRACIONES

"previeneteconviene"

relacionessexualessin riesgo

Seguro que ya sabes para qué se utiliza un preservativo?... ¿y la píldora del día después?
Pues bien, desde aquí voy a intentar aclararte estas dudas para que puedas disfrutar tus relaciones sexuales sin el menor riesgo.





EL PRESERVATIVO

ormalmente se llama condón y es el único método anticonceptivo que te protege de enfermedades de transmisión sexual, como el SIDA, y además contra el embarazo (en casi un 90% en los casos) si lo usas correctamente.

preservativo es un recipiente de látex que se pone sobre el pene erecto durante las relaciones sexuales y que guarda el semen de la eyaculación.







- o más importante es que sepas bien cómo se usa:
- Úsalo siempre antes de la penetración y cógelo con cuidado para no rozarlo con las uñas y así, que no se rompa
- Póntelo en el pene erecto y poco a poco desenróllalo, presionándolo fuerte para que suelte el aire.
- Deja un espacio libre en la punta para que se pueda almacenar el semen.
- Cuando hayáis terminado, quítatelo con cuidado sujetando la base para que no caiga más semen














Si eres alérgico al látex, encontrarás preservativos hechos con otros materiales pero que tiene la misma seguridad que los otros.

Que no te "dé pereza" utilizar un condón. No pienses que, por una sólo vez, no te va a pasar nada a ti y... toma medidas.



usa la cabeza sé responsable





En caso de emergencia, o si necesitas información sobre qué hacer o dónde acudir, llama al 112 y allí te informarán.





USA la Cabeza sé responsable



LA PILDORA

del día después

🕕 ambién se llama píldora postcoital.


Sólo debe tomarse en casos específicos, ya que es un anticonceptivo únicamente de emergencia. Debes tomarla de forma excepcional, y no de forma habitual como si de otro método anticonceptivo se tratase.





📵 a píldora postcoital evita el embarazo en un alto porcentaje de los casos, pero es importante que sepas que sólo debe tomarse bajo prescripción médica en Hospitales, Servicios de Urgencia, Centros de Atención a la Mujer en donde se os atenderá con total confidencialidad. Una vez que expliques lo que te ha ocurrido y por qué estás interesada en que te proporcionen la píldora postcoital, te la darán gratuitamente.





Entre la primera y la segunda pildora tienen que pasar 12 horas de tiempo, y si vomitas cualquiera de las dos, es importante que vuelvas a tomar otra para que surja efecto.

Y NO LO OLVIDES

... si practicas relaciones sexuales debes utilizar un método anticonceptivo adecuado a tus necesidades. Consulta al ginecólogo o a los especialistas en consultas de planificación familiar para que te ayuden.



