

# PRÉVENIR, C'EST GUÉRIR

- Ne faites pas le test si vous avez des hémorroïdes saignantes ou pendant la menstruation. Dans ce cas, vous devez attendre 3 jours de suite qu'il n'y ait plus de pertes de sang avant d'effectuer le test.
- Évitez la contamination des selles avec l'urine.
- Il n'est pas nécessaire d'être à jeun ni de suivre un régime alimentaire spécial avant de réaliser le test.
- Prendre des médicaments n'interfère pas avec la réalisation du test.
- N'ingérez pas le liquide du tube. Si le liquide entre en contact avec les yeux, la bouche ou la peau, lavez la zone à grande eau et, si nécessaire, consultez votre médecin ou votre pharmacien habituel.
- Gardez le tube hors de portée des enfants.
- Communiquez au programme la perte du test ou tout autre inconvénient souffert pendant la réalisation du test.

## Plus d'informations:

Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra  
Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon

Francisco Bergamin 2 bis, 31003 Pamplona

**Tél. : 848 42 34 98**

[precolon@navarra.es](mailto:precolon@navarra.es)

Traduction directive basée sur le texte original de l'institut national de santé publique et de sécurité du travail en Navarre



## INSTRUCTIONS POUR LE PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLONS

### TEST DE DÉTECTION DU SANG CACHÉ DANS LES SELLES

**ELIGE90**  
PROGRAMME DE  
DÉPISTAGE DU CANCER  
DU CÔLON


 **Gobierno  
de Navarra**



# INSTRUCTIONS DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON


# OC-SENSOR

## 1



Sortez le tube de la poche.

## 2




Vérifiez que le tube porte votre nom

## 3




Placez une bande de papier hygiénique sur les WC et asseyez-vous, si possible, face à la chasse d'eau.

## 4




Dévissez le bouchon vert et retirez le bâtonnet.

## 5



Mettez la pointe du bâtonnet en contact avec les selles et glissez-la dessus en traçant des lignes horizontales et verticales.

## 6



Une petite quantité d'excrément suffit.

## 7



Remettez le bâtonnet vert dans le tube, bouchez-le bien et agitez-le pendant quelques secondes.

## 8



Rangez le tube dans la poche et gardez le tout au réfrigérateur (pas dans le congélateur) jusqu'au moment de l'apporter au centre de santé (maximum 3 jours).