







Perfil de CC.AA. para el Último año según indicador

Documento generado por INCLASNS. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (7/2/2019 - 13:38)

Comunidad Autónoma: Navarra, C. Foral de (NC)

Sexo: Mujeres

Año: Último año según indicador

Indicador	Valor	Valor nacional	Evolución temporal	Posición con respecto a otras CC.AA (la caja incluye el 80% de los valores)	Observaciones
Índice de dependencia	ND		En esta CC.AA.: ND En el total nacional: ND	ND	
Esperanza de vida al nacer Año: 2016	86,96	86,23	En esta CC.AA.: 1991 - 2016  En el total nacional: 1991 - 2016 		
Años de vida saludable al nacer Año: 2016	63,45	62,60	En esta CC.AA.: 2006 - 2016  En el total nacional: 2006 - 2016 		El indicador incluido en Eurostat se calcula bajo la misma metodología para los países de la unión europea con información sobre limitación de actividad de encuestas europeas.. El dato de Ceuta y Melilla se calcula para ambas Ciudades Autónomas en conjunto, pero se presenta separadamente en cada una de sus columnas de datos correspondiente.

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.

ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación INCLASNS

Indicador	Valor	Valor nacional	Evolución temporal	Posición con respecto a otras CC.AA (la caja incluye el 80% de los valores)	Observaciones
Años de vida saludable a los 65 años. Año: 2016	12,25	9,61	<p>En esta CC.AA.: 2006 - 2016</p> <p>En el total nacional: 2006 - 2016</p>		El indicador incluido en Eurostat se calcula bajo la misma metodología para los países de la unión europea con información sobre limitación de actividad de encuestas europeas. El dato de Ceuta y Melilla se calcula para ambas Ciudades Autónomas en conjunto, pero se presenta separadamente en cada una de sus columnas de datos correspondiente
Porcentaje de población con valoración positiva de su estado de salud Año: 2017	70,08	70,43	<p>En esta CC.AA.: 1993 - 2017</p> <p>En el total nacional: 1993 - 2017</p>		Los resultados se infieren a población general (resultados ponderados)
Porcentaje de población de 65 años y más años con valoración positiva de su estado de salud Año: 2017	42,31	39,97	<p>En esta CC.AA.: 1993 - 2017</p> <p>En el total nacional: 1993 - 2017</p>		Los resultados se infieren a población general (resultados ponderados)
			<p>En esta CC.AA.: 1990 - 2016</p> <p>En el total nacional:</p>		

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.








ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación INCLASNS

Indicador	Valor	Valor nacional	Evolución temporal	Posición con respecto a otras CC.AA (la caja incluye el 80% de los valores)	Observaciones
Tasa de mortalidad prematura por cáncer, ajustada por edad, por 100 000 hab Año: 2016	62,76	67,96	1990 - 2016 		
Tasa de mortalidad prematura por cardiopatía isquémica, ajustada por edad, por 100 000 hab. Año: 2016	4,06	6,09	En esta CC.AA.: 1990 - 2016 En el total nacional: 1990 - 2016 		
Tasa de mortalidad prematura por diabetes mellitus, ajustada por edad, por 100 000 hab. Año: 2016	3,38	1,75	En esta CC.AA.: 1990 - 2016 En el total nacional: 1990 - 2016 		
Tasa de mortalidad prematura por enfermedad vascular cerebral, ajustada por edad, por 100 000 hab. Año: 2016	4,19	5,76	En esta CC.AA.: 1990 - 2016 En el total nacional: 1990 - 2016 		

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.

ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación INCLASNS

Indicador	Valor	Valor nacional	Evolución temporal	Posición con respecto a otras CC.AA (la caja incluye el 80% de los valores)	Observaciones
Tasa de mortalidad prematura por enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores, ajustada por edad, por 100 000 hab. Año: 2016	2,73	2,40	<p>En esta CC.AA.: 1990 - 2016</p>  <p>En el total nacional: 1990 - 2016</p> 		
Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos Año: 2016	2,77	2,32	<p>En esta CC.AA.: 2013 - 2016</p>  <p>En el total nacional: 2013 - 2016</p> 		
Tasa de mortalidad perinatal	ND		<p>En esta CC.AA.: ND</p> <p>En el total nacional: ND</p>	ND	
Incidencia de tuberculosis	ND		<p>En esta CC.AA.: ND</p> <p>En el total nacional: ND</p>	ND	Datos desde 2007. Años anteriores solo para tuberculosis respiratoria disponibles en la fuente original
			<p>En esta CC.AA.: 1993 - 2017</p>  <p>En el total nacional:</p>		

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.







ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación INCLASNS

Indicador	Valor	Valor nacional	Evolución temporal	Posición con respecto a otras CC.AA (la caja incluye el 80% de los valores)	Observaciones
Prevalencia declarada de diabetes en la población adulta Año: 2017	6,74	7,11	1993 - 2017 		Los datos anteriores a 2011 se refieren a población de 16 y mas años.. Los resultados se infieren a población general (resultados ponderados).
Prevalencia declarada de trastornos mentales en población adulta Año: 2017	13,02	14,15	En esta CC.AA.: 2006 - 2017 En el total nacional: 2006 - 2017 		Los datos anteriores a 2011 se refieren a población de 16 y mas años.. Los resultados se infieren a población general (resultados ponderados).
Tasa ajustada de hospitalización por infarto agudo de miocardio, por 10 000 hab. Año: 2015	2,80	3,67	En esta CC.AA.: 2010 - 2015 En el total nacional: 2010 - 2015 		Tasa ajustada por edad. Es posible consultar tasas brutas y ajustadas por esta u otras causas en : http://pestadistico.inteligenciadegestion.mssi.es/Default.aspx (Conjunto Mínimo Básico de Datos - hospitalización - diagnósticos). La inclusión de hospitales privados en el CMBD se inicia en 2005 y se incrementa paulatinamente. La serie se inicia en 2010, año en que la cobertura supera ya el 85%-90% de las altas de hospitales de agudos. . Para antes de 2010 se ofrecen las tasas de hospitalización para el SNS - ver Indicador 021409.
Prevalencia de consumo de tabaco en población adulta Año: 2017	15,18	18,76	En esta CC.AA.: 1993 - 2017 En el total nacional: 1993 - 2017 		Los datos anteriores a 2011 se refieren a población de 16 y mas años.. Los resultados se infieren a población general (resultados ponderados).
En esta CC.AA.:					

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.


ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación INCLASNS

Indicador	Valor	Valor nacional	Evolución temporal	Posición con respecto a otras CC.AA (la caja incluye el 80% de los valores)	Observaciones
Prevalencia de obesidad en población de 18 y mas años Año: 2017	13,77	16,74	1993 - 2017  En el total nacional: 1993 - 2017		Los resultados se infieren a población general (resultados ponderados).
Prevalencia de obesidad en población infantil Año: 2017	1,35	10,20	En esta CC.AA.: 2003 - 2017  En el total nacional: 2003 - 2017		Los resultados se infieren a población general (resultados ponderados).
Proporción de población de 25 a 64 años con nivel de estudios de 1º Etapa de educación secundaria o inferior Año: 2016	30,30	39,10	En esta CC.AA.: 2010 - 2016  En el total nacional: 1992 - 2016		Los datos deben ser tomados con precaución, pues los derivados de tamaños muestrales pequeños están afectados por fuertes errores de muestreo.. En la codificación del nivel de formación completado, hasta el cuarto trimestre de 1999 se aplica la clasificación ad-hoc EPA-92, a partir del año 2000 la CNED-2000 y a partir de 2014 la CNED-2014 . Hasta 1999 los resultados se refieren al segundo trimestre del año y a partir de 2000 están basados en medias anuales de datos trimestrales.
Cobertura (%) de personas mayores de 64 años vacunadas frente a la gripe	ND		En esta CC.AA.: ND En el total nacional: ND	ND	Para el cálculo de la cobertura de vacunación se utilizan las dosis administradas en los dispositivos del SNS. No incluye vacunas adquiridas en Oficinas de Farmacia y administradas a través del sector sanitario privado.
Cobertura (%) de vacunación frente a la			En esta CC.AA.: ND		Para el cálculo de la cobertura de vacunación se utilizan únicamente las dosis administradas en

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.



ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación INCLASNS

Indicador	Valor	Valor nacional	Evolución temporal	Posición con respecto a otras CC.AA (la caja incluye el 80% de los valores)	Observaciones
poliomielitis (primovacunación 0-1 años)	ND		En el total nacional: ND	ND	los dispositivos del SNS. No se incluyen vacunas adquiridas en Oficinas de Farmacia y administradas a través del sector sanitario privado
Cobertura (%) de vacunación frente a sarampión-rubéola-parotiditis (primovacunación)	ND		En esta CC.AA.: ND En el total nacional: ND	ND	Para el cálculo de la cobertura de vacunación se utilizan únicamente las dosis administradas en los dispositivos del SNS. No se incluyen vacunas adquiridas en Oficinas de Farmacia y administradas a través del sector sanitario privado.. En 2013 se acuerda unificar la primovacunación frente a estos tres virus con una dosis a los 12 meses. Conceptualmente esto no significa un cambio en la serie de datos de cobertura
Porcentaje de mujeres de 50 a 69 años con mamografía realizada con la frecuencia recomendada	ND		En esta CC.AA.: ND En el total nacional: ND	ND	Los resultados se infieren a población general (resultados ponderados).
Porcentaje de población cubierta por el sistema sanitario público	ND		En esta CC.AA.: ND En el total nacional: ND	ND	
Tiempo medio de espera (días) para una intervención quirúrgica no urgente	ND		En esta CC.AA.: ND En el total nacional: ND	ND	
Tiempo medio de espera para una primera consulta Atención Especializada	ND		En esta CC.AA.: ND En el total nacional: ND	ND	
			En esta CC.AA.: 1990 - 2016  En el total nacional:		

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.

ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación INCLASNS






Indicador	Valor	Valor nacional	Evolución temporal	Posición con respecto a otras CC.AA (la caja incluye el 80% de los valores)	Observaciones
Incidencia de interrupciones voluntarias del embarazo en menores de 20 años Año: 2016	7,34	8,97	1990 - 2016 		
Incidencia de hepatitis B por cada 100 000 hab.	ND		En esta CC.AA.: ND En el total nacional: ND	ND	Hasta 2005, la tasa se calcula a partir de la notificación numérica de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Empezando en 2006, las tasas se basan en los casos declarados individualmente, de acuerdo a las definiciones de casos confirmados y probables oficiales
Personal médico atención primaria por 1000 personas asignadas	ND		En esta CC.AA.: ND En el total nacional: ND	ND	
Camas hospitalarias en funcionamiento por 1000 hab.	ND		En esta CC.AA.: ND En el total nacional: ND	ND	
Puestos en hospitales de día por 1000 hab.	ND		En esta CC.AA.: ND En el total nacional: ND	ND	A partir de 2010 se incluyen puestos de hospital de día quirúrgicos tanto en unidades integradas como separadas de cirugía mayor ambulatoria
Equipos de hemodinámica en funcionamiento por 100 000 hab.	ND		En esta CC.AA.: ND En el total nacional: ND	ND	



La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.







ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación INCLASNS

Indicador	Valor	Valor nacional	Evolución temporal	Posición con respecto a otras CC.AA (la caja incluye el 80% de los valores)	Observaciones
Frecuentación en medicina de atención primaria por persona asignada/año Año: 2017	5,27	5,77	2007 - 2017 		
Tasa de uso de resonancia magnética por 1000 hab./ año	ND		En esta CC.AA.: ND En el total nacional: ND	ND	Incluye tanto hospitales públicos como privados
Índice de la estancia media ajustada (IEMA)	ND		En esta CC.AA.: ND En el total nacional: ND	ND	Incluye todas las altas de hospitales de la red de hospitales del SNS (hospitales públicos, red de utilización pública y hospitales con concierto sustitutorio). No incluye hospitales psiquiátricos ni de larga estancia. [Nota: Desde 2016 inclusive las altas están codificadas en CIE10ES y el Sistema de Clasificación de Pacientes son los GRD-APR.
Porcentaje de cirugía ambulatoria en el SNS Año: 2016	39,75	47,10	En esta CC.AA.: 2004 - 2016  En el total nacional: 2004 - 2016 		Hasta 2003 inclusive se consideran las intervenciones de cirugía mayor ambulatoria (CMA) registradas a través de ESCRI (Estadística de Centros en Régimen de Internado).. Cobertura parcial de los registros en la comunidad autónoma de Galicia, hasta 2012. Desde 2016 se tiene en cuenta la modalidad asistencial y la estancia.
DHD de antibióticos	ND		En esta CC.AA.: ND En el total nacional: ND	ND	
Gasto sanitario público territorializado, por habitante protegido	ND		En esta CC.AA.: ND En el total nacional: ND	ND	El gasto sanitario de Cantabria en el año 2012 incluye la imputación a presupuestos de los pagos tramitados a través del Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores. Habitante protegido: Hasta 2011 se usa el Padrón a 1 de enero menos los colectivos del Mutualismo Administrativo (MUFACE, MUGEJU e ISFAS).Desde 2012: Población incluida en la bases de datos de tarjeta sanitaria individual

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.










ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación INCLASNS

Indicador	Valor	Valor nacional	Evolución temporal	Posición con respecto a otras CC.AA (la caja incluye el 80% de los valores)	Observaciones
Porcentaje del gasto sanitario en atención primaria	ND		En esta CC.AA.: ND En el total nacional: ND	ND	Las estadísticas internacionales realizan una agrupación funcional de acuerdo con el manual del Sistema de Cuentas de Salud (SCS) que no se corresponde con la EGSP
Porcentaje del gasto en farmacia	ND		En esta CC.AA.: ND En el total nacional: ND	ND	OMS. Gasto farmacéutico total como porcentaje del gasto sanitario total. En ambos casos se excluye el gasto farmacéutico de instituciones sanitarias (hospitales)
Tasa de cesáreas Año: 2016	16,43	24,82	En esta CC.AA.: 1996 - 2016  En el total nacional: 1996 - 2016 		Incluye tanto hospitales públicos como privados
Porcentaje de histerectomías en mujeres menores de 35 años Año: 2016	1,10	1,55	En esta CC.AA.: 1997 - 2016  En el total nacional: 1997 - 2016 		El procedimiento quirúrgico puede ser efectuado sin ingreso en el hospital por lo que deben incluirse también los casos de cirugía sin ingreso. Calculado solo para hospitales del SNS (hospitales públicos, red de utilización pública y hospitales con concierto sustitutorio). No incluye hospitales psiquiátricos ni de larga estancia. En 2016 se implanta un nuevo modelo de datos y nueva clasificación (CIE-10-ES). Posibles diferencias en los resultados del indicador con respecto a la serie histórica deben interpretarse tomando en consideración dichos cambios. (1)

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.







ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación INCLASNS

Indicador	Valor	Valor nacional	Evolución temporal	Posición con respecto a otras CC.AA (la caja incluye el 80% de los valores)	Observaciones
Porcentaje de cirugía conservadora en cáncer de mama	ND		En esta CC.AA.: ND En el total nacional: ND	ND	Con CIE 10 ES las resecciones de mama que se acompañan en el mismo episodio quirúrgico de una sustitución de la misma se codifican solo con el código de Sustitución (no se codifica la Resección de mama). Un código de Sustitución de mama en un episodio puede corresponder a una mastectomía + sustitución o simplemente a una Sustitución de mama que se haga en un episodio posterior al de la mastectomía. Los códigos CIE 9 85.43 a 85.48 incluyen la linfadenectomía y en CIE 10 ES se codificaría con códigos aparte de escisión o resección de cadena linfática.
Porcentaje de pacientes con fractura de cadera intervenidos en las primeras 48 horas Año: 2016	56,84	48,06	En esta CC.AA.: 1998 - 2016  En el total nacional: 1997 - 2016 		El porcentaje de registros con procedimientos quirúrgicos realizados donde no conste la fecha de la intervención es variable según años. Calculado solo para hospitales del SNS (hospitales públicos, red de utilización pública y hospitales con concierto sustitutorio). No incluye hospitales psiquiátricos ni de larga estancia. En 2016 se implanta un nuevo modelo de datos y nueva clasificación (CIE-10-ES). Posibles diferencias en los resultados del indicador con respecto a la serie histórica deben interpretarse tomando en consideración dichos cambios.
Tasa de notificación de reacciones adversas graves a medicamentos Año: 2016	461,58	271,41	En esta CC.AA.: 1992 - 2016  En el total nacional: 1992 - 2016 		Desde enero 2013 se dispone de un portal único para notificar al SEFV-H: https://www.notificaRAM.es . Se ofrece tanto para los profesionales sanitarios como para los ciudadanos , según se establece en las nuevas normativas europeas de Farmacovigilancia
Mortalidad intrahospitalaria postinfarto por cada 100 altas por infarto Año: 2016	11,36	10,44	En esta CC.AA.: 1997 - 2016  En el total nacional: 1997 - 2016 		Calculado para los centros pertenecientes al SNS: La red Pública SNS está compuesta por aquellos centros de dependencia y financiación pública más los centros de dependencia privada (con o sin ánimo de lucro) que mantiene un concierto sustitutorio o pertenecen a una Red de Utilización Pública es decir están financiados con fondos públicos. En 2016 se implanta un nuevo modelo de datos y nueva clasificación (CIE-10-ES). Posibles diferencias en los resultados del indicador con respecto a la serie histórica deben interpretarse tomando en consideración dichos cambios.

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.

ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación INCLASNS

Indicador	Valor	Valor nacional	Evolución temporal	Posición con respecto a otras CC.AA (la caja incluye el 80% de los valores)	Observaciones
Tasa de amputaciones miembro inferior en personas diabéticas Año: 2016	0,02	0,04	<p>En esta CC.AA.: 1997 - 2016</p>  <p>En el total nacional: 1997 - 2016</p> 		Calculado solo para hospitales del SNS (hospitales públicos, red de utilización pública y hospitales con concierto sustitutorio). No incluye hospitales psiquiátricos ni de larga estancia. [En 2016 se implanta un nuevo modelo de datos y nueva clasificación (CIE-10-ES). Posibles diferencias en los resultados del indicador con respecto a la serie histórica deben interpretarse tomando en consideración dichos cambios.](1) En CIE 10 ES están incluidas las categorías de diabetes secundarias, no contempladas en la serie con CIE 9 MC.
Grado de satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento del sistema sanitario público Año: 2017	6,75	6,62	<p>En esta CC.AA.: 2005 - 2017</p>  <p>En el total nacional: 2005 - 2017</p> 		Para el cálculo de los valores de este indicador no se han tomado en consideración los valores "no sabe" y "no contesta" de los resultados oficiales del Barómetro Sanitario en las tres variables consideradas. En consecuencia, sus valores pueden no coincidir exactamente con los de las tabulaciones total y por comunidades autónomas del citado barómetro.

La caja del gráfico de barras representa el 80% de los valores. Los bigotes representan el máximo y el mínimo. La línea central representa la media nacional y el punto el valor de la CC.AA.

El eje vertical de los gráficos de evolución temporal no contiene el valor cero. Para valorar de forma más precisa la magnitud de la evolución temporal puede utilizar la opción de gráficos temporales de la aplicación.

ND* Para el año que ha seleccionado no hay datos. Puede ser que la fuente de información no proporcione datos para ese año, o para el nivel de desagregación especificado o que aún no estén cargados en la aplicación INCLASNS