



Zona Básica de Salud

Isaba / Izaba



Observatorio de Salud Comunitaria de Navarra
Nafarroako Osasun Komunitarioaren Behatokia



1. Información general

Población (2020):	1.288 habitantes Mujeres: 57,8% Hombres: 62,9%
Edad media:	Mujeres: 56,2 Hombres: 53,7
Tasa de natalidad:	3,1‰
Índice dependencia juvenil:	12,8%
Índice dependencia senil:	61%
Población nacida extranjero:	5,1%
Esperanza de vida:	Mujeres: 86,9 Hombres: 82,7
Extensión:	438,97 km ²
Zona POT a la que pertenece:	Pirineo (ver mapa)
Municipios:	Burgui, Castillo-Nuevo, Garde, Isaba, Roncal, Urzainqui, Uztarroz, Vidangoz.

2. La comunidad y la salud

Factores sociodemográficos y ambientales. Isaba es una de las zonas con menor tasa de desempleo (5,5%), menor tasa de riesgo de pobreza severa (4,2%) y menor porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años sin título de graduado en ESO (6,3%). En el periodo 2017-2019, no se registraron nacimientos de madres menores de 20 años. Además, es una de las zonas con mayor superficie forestal de Navarra (65,1%). Por otro lado, es una de las zonas con mayor porcentaje de hogares unipersonales de hombres de 80 o más años (35,6%).

Resultados en salud. La Zona Básica de Salud de Isaba se encuentra entre el 25,0% de las Zonas Básicas con mejor resultado en lactancia materna exclusiva a los 6 meses (41,9%), en prevalencia de mujeres diagnosticadas de diabetes tipo 2 (3,5%), en el indicador de personas diabéticas con medición de HbA1c (81,2%) y en el indicador de personas hipertensas con medición de TA (70,0%). Igualmente, está entre las zonas con mejores resultados en consumo de ansiolíticos y antidepresivos (15,1% en mujeres y 7,1% en hombres). También es la Zona Básica con mejor resultado de Navarra en pacientes con 3 o más patologías priorizadas en la estrategia de crónicos (1,2%).

Indicadores de encuesta. Los siguientes resultados ajustados* corresponden a la zona Navarra Atlántica-Pirineo (zonificación POT), a la que pertenece la zona básica de Isaba. Navarra Atlántica-Pirineo presenta el mejor resultado en sedentarismo en mujeres (19,7%). Por el contrario, presenta los peores resultados en consumo de alcohol semanal (6,3% en mujeres y 34,4% en hombres), consumo diario de tabaco en mujeres (13,1%), consumo diario de frutas y verduras en hombres (18,8%) y exceso de peso en personas de 15 o más años (45,0% en mujeres y 61,1% en hombres). *Nota: Los indicadores de encuesta, y otros que así lo requieren, se han ajustado por sexo y edad para posibilitar la comparación entre zonas. Los indicadores brutos aparecen al pie de la siguiente página.


Recursos para la salud

En la comunidad existen activos de salud o recursos que pueden potenciar la capacidad de las personas, las comunidades y las poblaciones para mantener y generar salud y bienestar (salutogénesis).

[-> Ver Mapa de Activos de la Zona](#)

3. Resumen indicadores

La siguiente figura muestra, para una serie de indicadores, los valores de la zona (punto rojo) respecto a la media de Navarra (barra vertical) y respecto al conjunto de zonas básicas de Navarra. Para una descripción más detallada de los indicadores pueden consultarse sus [fichas individuales](#), disponibles en la página web del Observatorio.



Fuente de indicadores: 1: Mov. Natural Población; 2, 5-6: SIPNa; 3: Estad. Municipal de Pob. Activa; 4: Estad. Renta; 7: SIGPAC; 8, 23-26, 29-30: Atención Primaria; 9-20: ESyCV; 21-22: ISPLN; 27-28: Prestación Farmacéutica

Indicadores de la zona Pirineo (9-20) según Zonificación POT (NASTAT). Número de valores representados en la figura: 4.

* Significativamente diferentes ($p < 0,05$) al resultado de Navarra (contraste realizado para indicadores de estilos de vida, morbilidad y sistema de salud).

1. Tasa promedio anual específica de fecundidad (‰) de mujeres 14-19 años; 2. % de jóvenes de 18-24 años sin título de graduado en ESO o equivalentes; 3. % de parados respecto a la población activa; 4. % de personas que viven en hogares cuya renta total equivalente está por debajo del umbral de pobreza severa; 5 y 6. % de personas ≥ 80 años que residen solas en relación al total de residentes de esta edad en viviendas familiares; 7. % de superficie forestal; 8. % bebés con lactancia materna exclusiva a los 170-190 días; 9 y 10. % ajustado de personas ≥ 15 años que consume diariamente frutas y verduras (T. bruta: mujeres 40,4 y hombres 20,4); 11 y 12. % ajustado de personas ≥ 15 años sedentarias: declaran no hacer ejercicio (T. bruta: mujeres 20,1 y hombres 14,5); 13 y 14. % ajustado de personas ≥ 15 años que consumen >100 g de alcohol a la semana (T. bruta: mujeres 6,3 y hombres 34,5); 15 y 16. % ajustado de personas ≥ 15 años que consumen tabaco a diario (T. bruta: mujeres 13,8 y hombres 15,3); 17 y 18. % ajustado de personas ≥ 15 años que presentan un bajo bienestar general (T. bruta: mujeres 26,3 y hombres 15,8); 19 y 20. % ajustado de personas ≥ 15 años con exceso de peso: sobrepeso u obesidad (T. bruta: mujeres 47,2 y hombres 61,6); 21 y 22. Prevalencia ajustada de exceso de peso – sobrepeso u obesidad – en población infantil de 6-9 años, definido según patrones de crecimiento infantil OMS (T. bruta: mujeres 33 y hombres 30,4); 23 y 24. Prevalencia ajustada de personas ≥ 20 años con diabetes tipo 2 (T. bruta: mujeres 6,5 y hombres 11,8); 25 y 26. % ajustado de personas ≥ 65 años con ≥ 3 patologías priorizadas en la Estrategia de Crónicos (T. bruta: mujeres 2,2 y hombres 6,5); 27 y 28. % ajustado de personas con consumo de ≥ 3 envases en el último año de alguno de estos grupos: N50B ansiolíticos, N05C hipnóticos y sedantes y/o N06A antidepresivos (T. bruta: mujeres 24,6 y hombres 11,1); 29. % de población > 14 años con diabetes tipo 2 que tiene medición de hemoglobina glicosilada (HbA1c) en el último año; 30. % de población > 14 años con diagnóstico de hipertensión que tienen medición de la tensión arterial (TA) en el último año.