



Zona Básica de Salud Lodosa



Observatorio de Salud Comunitaria de Navarra
Nafarroako Osasun Komunitarioaren Behatokia



Fuente: SITNA-ISPLN



1. Información general

Población (2020):	10.990 habitantes Mujeres: 49% Hombres: 51%
Edad media:	Mujeres: 47 Hombres: 44,6
Tasa de natalidad:	7,5‰
Índice dependencia juvenil:	21,8%
Índice dependencia senil:	38%
Población nacida extranjero:	13,8%
Esperanza de vida:	Mujeres: 86,3 Hombres: 80,1
Extensión:	226,3 km ²
Zona POT a la que pertenece:	Eje del Ebro (ver mapa)
Municipios:	Lazagurría, Lodosa, Mendavia, Sartaguda, Sesma.

2. La comunidad y la salud

Factores sociodemográficos y ambientales.

Lodosa es una de las Zonas Básicas de Salud con mayor tasa de desempleo (11,9%), con mayor tasa de riesgo de pobreza severa (13,0%) y con mayor porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años sin título de graduado en ESO (21,3%). También es una de las zonas con mayor proporción de nacimientos de madres menores de 20 años (8,0‰).

Resultados en salud. La Zona Básica de Salud de Lodosa se encuentra entre el 25,0% de las Zonas Básicas con mejor resultado en personas diabéticas con medición de HbA1c (75,4%) y en personas hipertensas con medición

de TA (72,5%). Por el contrario, está entre las zonas con peores resultados en prevalencia de personas diagnosticadas de diabetes tipo 2 (7,0% en mujeres y 10,9% en hombres), en pacientes con 3 o más patologías priorizadas en la estrategia de crónicos (4,3%) y en lactancia materna exclusiva a los 6 meses (20,5%). Lodosa es la zona que presenta el peor resultado de Navarra en consumo de ansiolíticos y antidepresivos en mujeres (21,4%), y está entre los peores en hombres (10,5%). También es la zona con peor resultado en exceso de peso infantil en niñas de 6 a 9 años (43,9%), estando, así mismo, entre las que presentan peores resultados de este indicador en niños (33,3%).

Indicadores de encuesta. Los siguientes resultados ajustados* corresponden a la zona Eje del Ebro (zonificación POT), a la que pertenece la zona básica de Lodosa. El Eje del Ebro presenta el mejor resultado en bajo bienestar general en hombres (11,8%) y en consumo de alcohol semanal en mujeres (3,5%). Por el contrario, presenta los peores resultados en consumo de tabaco diario en hombres (18,7%), en consumo diario de frutas y verduras en mujeres (31,7%) y en sedentarismo (26,6% en mujeres y 20,1% en hombres).

***Nota:** Los indicadores de encuesta, y otros que así lo requieren, se han ajustado por sexo y edad para posibilitar la comparación entre zonas. Los indicadores brutos aparecen al pie de la siguiente página.


Recursos para la salud

En la comunidad existen activos de salud o recursos que pueden potenciar la capacidad de las personas, las comunidades y las poblaciones para mantener y generar salud y bienestar (salutogénesis).

[-> Ver Mapa de Activos de la Zona](#)

3. Resumen indicadores

La siguiente figura muestra, para una serie de indicadores, los valores de la zona (punto rojo) respecto a la media de Navarra (barra vertical) y respecto al conjunto de zonas básicas de Navarra. Para una descripción más detallada de los indicadores pueden consultarse sus [fichas individuales](#), disponibles en la página web del Observatorio.



Fuente de indicadores: 1: Mov. Natural Población; 2, 5-6: SIPNa; 3: Estad. Municipal de Pob. Activa; 4: Estad. Renta; 7: SIGPAC; 8, 23-26, 29-30: Atención Primaria; 9-20: ESyCV; 21-22: ISPLN; 27-28: Prestación Farmacéutica

Indicadores de la zona Eje del Ebro (9-20) según Zonificación POT (NASTAT). Número de valores representados en la figura: 4.

* Significativamente diferentes ($p < 0,05$) al resultado de Navarra (contraste realizado para indicadores de estilos de vida, morbilidad y sistema de salud).

1. Tasa promedio anual específica de fecundidad (‰) de mujeres 14-19 años; 2. % de jóvenes de 18-24 años sin título de graduado en ESO o equivalentes; 3. % de parados respecto a la población activa; 4. % de personas que viven en hogares cuya renta total equivalente está por debajo del umbral de pobreza severa; 5 y 6. % de personas ≥ 80 años que residen solas en relación al total de residentes de esta edad en viviendas familiares; 7. % de superficie forestal; 8. % bebés con lactancia materna exclusiva a los 170-190 días; 9 y 10. % ajustado de personas ≥ 15 años que consume diariamente frutas y verduras (T. bruta: mujeres 32,6 y hombres 18,8); 11 y 12. % ajustado de personas ≥ 15 años sedentarias: declaran no hacer ejercicio (T. bruta: mujeres 27,6 y hombres 20,9); 13 y 14. % ajustado de personas ≥ 15 años que consumen >100 g de alcohol a la semana (T. bruta: mujeres 3,4 y hombres 25,7); 15 y 16. % ajustado de personas ≥ 15 años que consumen tabaco a diario (T. bruta: mujeres 11,5 y hombres 18,3); 17 y 18. % ajustado de personas ≥ 15 años que presentan un bajo bienestar general (T. bruta: mujeres 24,5 y hombres 11,8); 19 y 20. % ajustado de personas ≥ 15 años con exceso de peso: sobrepeso u obesidad (T. bruta: mujeres 38,7 y hombres 58,5); 21 y 22. Prevalencia ajustada de exceso de peso – sobrepeso u obesidad – en población infantil de 6-9 años, definido según patrones de crecimiento infantil OMS (T. bruta: mujeres 44,7 y hombres 34,4); 23 y 24. Prevalencia ajustada de personas ≥ 20 años con diabetes tipo 2 (T. bruta: mujeres 9 y hombres 11,8); 25 y 26. % ajustado de personas ≥ 65 años con ≥ 3 patologías priorizadas en la Estrategia de Crónicos (T. bruta: mujeres 5,2 y hombres 6,8); 27 y 28. % ajustado de personas con consumo de ≥ 3 envases en el último año de alguno de estos grupos: N50B ansiolíticos, N05C hipnóticos y sedantes y/o N06A antidepresivos (T. bruta: mujeres 25,6 y hombres 11,3); 29. % de población > 14 años con diabetes tipo 2 que tiene medición de hemoglobina glicosilada (HbA1c) en el último año; 30. % de población > 14 años con diagnóstico de hipertensión que tienen medición de la tensión arterial (TA) en el último año.