



# Zona Básica de Salud San Jorge / Sanduzelai



Observatorio de Salud Comunitaria de Navarra  
Nafarroako Osasun Komunitarioaren Behatokia



## 1. Información general

Población (2020):	11.994 habitantes Mujeres: 50,5% Hombres: 49,5%
Edad media:	Mujeres: 44,1 Hombres: 41,6
Tasa de natalidad:	7,9‰
Índice dependencia juvenil:	24,7%
Índice dependencia senil:	32,7%
Población nacida extranjero:	28,6%
Esperanza de vida:	Mujeres: 84,6 Hombres: 80
Extensión:	1,52 km <sup>2</sup>
Zona POT a la que pertenece:	Área Central ( <a href="#">ver mapa</a> )
Municipios: Pamplona/Iruña (distrito-sección: 07-010 a 07-014 y 07-017 a 07-020).	

## 2. La comunidad y la salud

**Factores sociodemográficos y ambientales.** San Jorge se encuentra entre las Zonas Básicas de Salud con mayor tasa de riesgo de pobreza severa (13,1%) y con mayor proporción de nacimientos en madres menores de 20 años (7,3‰). Es, además, la zona de Navarra con mayor tasa de desempleo (16,3%) y con mayor porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años sin título de graduado en ESO (34,1%). Es también una de las cuatro Zonas Básicas situadas en la comarca de Pamplona sin superficie forestal (0,0%).

**Resultados en salud.** La Zona Básica de Salud de San Jorge se encuentra entre el 25,0% de las zonas básicas

con mejores resultados en lactancia materna exclusiva a los 6 meses (42,0%), en consumo de ansiolíticos y antidepresivos en hombres (8,0%), en personas diabéticas con medición de HbA1c (81,9%) y en personas hipertensas con medición de TA (53,9%). Por el contrario, está entre los peores resultados en prevalencia de personas diagnosticadas de diabetes tipo 2 (6,8% en mujeres y 9,8% en hombres), en pacientes con 3 o más patologías priorizadas en la estrategia de crónicos (4,7% en mujeres y 8,3% en hombres) y en exceso de peso infantil de 6 a 9 años (34,3% en niñas y 36,1% en niños).

**Indicadores de encuesta.** Los siguientes resultados ajustados\* corresponden a la zona Área Central (zonificación POT), a la que pertenece la zona básica de San Jorge. El Área Central presenta los mejores resultados en exceso de peso en personas de 15 o más años (32,7% en mujeres y 52,6% en hombres), en consumo de frutas y verduras en mujeres (39,1%) y en consumo de alcohol en hombres (25,3%). Por el contrario, presenta los peores resultados en consumo diario de tabaco en mujeres (13,1%) y en bajo bienestar general (27,8% en mujeres y 21,4% en hombres).

**\*Nota:** Los indicadores de encuesta, y otros que así lo requieren, se han ajustado por sexo y edad para posibilitar la comparación entre zonas. Los indicadores brutos aparecen al pie de la siguiente página.


### Recursos para la salud

En la comunidad existen activos de salud o recursos que pueden potenciar la capacidad de las personas, las comunidades y las poblaciones para mantener y generar salud y bienestar (salutogénesis).

[-> Ver Mapa de Activos de la Zona](#)

## 3. Resumen indicadores

La siguiente figura muestra, para una serie de indicadores, los valores de la zona (punto rojo) respecto a la media de Navarra (barra vertical) y respecto al conjunto de zonas básicas de Navarra. Para una descripción más detallada de los indicadores pueden consultarse sus [fichas individuales](#), disponibles en la página web del Observatorio.



Fuente de indicadores: 1: Mov. Natural Población; 2, 5-6: SIPNa; 3: Estad. Municipal de Pob. Activa; 4: Estad. Renta; 7: SIGPAC; 8, 23-26, 29-30: Atención Primaria; 9-20: ESyCV; 21-22: ISPLN; 27-28: Prestación Farmacéutica

# Indicadores de la zona Área Central (9-20) según Zonificación POT (NASTAT). Número de valores representados en la figura: 4.

\* Significativamente diferentes ( $p < 0,05$ ) al resultado de Navarra (contraste realizado para indicadores de estilos de vida, morbilidad y sistema de salud).

1. Tasa promedio anual específica de fecundidad (%) de mujeres 14-19 años; 2. % de jóvenes de 18-24 años sin título de graduado en ESO o equivalentes; 3. % de parados respecto a la población activa; 4. % de personas que viven en hogares cuya renta total equivalente está por debajo del umbral de pobreza severa; 5 y 6. % de personas ≥ 80 años que residen solas en relación al total de residentes de esta edad en viviendas familiares; 7. % de superficie forestal; 8. % bebés con lactancia materna exclusiva a los 170-190 días; 9 y 10. % ajustado de personas ≥ 15 años que consume diariamente frutas y verduras (T. bruta: mujeres 39,7 y hombres 19,6); 11 y 12. % ajustado de personas ≥ 15 años sedentarias: declaran no hacer ejercicio (T. bruta: mujeres 20,5 y hombres 17,1); 13 y 14. % ajustado de personas ≥ 15 años que consumen >100 g de alcohol a la semana (T. bruta: mujeres 5,2 y hombres 25); 15 y 16. % ajustado de personas ≥ 15 años que consumen tabaco a diario (T. bruta: mujeres 13,1 y hombres 18,5); 17 y 18. % ajustado de personas ≥ 15 años que presentan un bajo bienestar general (T. bruta: mujeres 27,8 y hombres 21,5); 19 y 20. % ajustado de personas ≥ 15 años con exceso de peso: sobrepeso u obesidad (T. bruta: mujeres 32,6 y hombres 51,8); 21 y 22. Prevalencia ajustada de exceso de peso – sobrepeso u obesidad – en población infantil de 6-9 años, definido según patrones de crecimiento infantil OMS (T. bruta: mujeres 34,5 y hombres 35,9); 23 y 24. Prevalencia ajustada de personas ≥ 20 años con diabetes tipo 2 (T. bruta: mujeres 7,3 y hombres 9,6); 25 y 26. % ajustado de personas ≥ 65 años con ≥ 3 patologías priorizadas en la Estrategia de Crónicos (T. bruta: mujeres 3,8 y hombres 7,5); 27 y 28. % ajustado de personas con consumo de ≥ 3 envases en el último año de alguno de estos grupos: N50B ansiolíticos, N05C hipnóticos y sedantes y/o N06A antidepresivos (T. bruta: mujeres 16,9 y hombres 7,6); 29. % de población > 14 años con diabetes tipo 2 que tiene medición de hemoglobina glicosilada (HbA1c) en el último año; 30. % de población > 14 años con diagnóstico de hipertensión que tienen medición de la tensión arterial (TA) en el último año.