


Zona Básica de Salud Burlada



Observatorio de Salud Comunitaria de Navarra
Nafarroako Osasun Komunitarioaren Behatokia



Fuente: SITNA-ISPLN



1. Información general

Población (2016):	18.338 habitantes
Extensión:	1,64 km ²
Zona Navarra2000 a la que pertenece :	Pamplona (ver mapa)
Municipios:	Burlada

2. La comunidad y la salud

La pirámide de población de la zona básica de Burlada configura una zona compuesta principalmente por mujeres y hombres entre los 40 y los 55, aunque presenta grupos numerosos en su base. Es una de las zonas básicas con menor tasa de hogares unipersonales de hombres (12,4%) y menor índice de dependencia senil (27,3%), sin alejarse demasiado de la media de Navarra en otros indicadores sociodemográficos.

La zona de Burlada se encuentra entre el 25% de zonas básicas de Navarra con peores resultados respecto a consumo de ansiolíticos y antidepresivos en mujeres (18,5%). También se encuentra entre las zonas con peores resultados respecto a esperanza de vida al nacer en hombres (79,2 años), sin destacar frente a la media de Navarra en esperanza de vida al nacer en mujeres (85,9 años). El porcentaje de personas diabéticas con control anual registrado en esta zona coincide con la media navarra.

Además de los anteriores, en la figura de la página siguiente se presentan los indicadores, procedentes de encuestas, de estilos de vida, empleo y nivel de estudios correspondientes a la Zonificación Navarra2000 de Pamplona, a la que pertenece la zona básica de Burlada. Según ellos, el 39,1% de los jóvenes de la zona declaran realizar consumos intensivos de alcohol (*binge drinking*) y el 20,8% consumen tabaco diariamente.


3. Recursos para la salud

En la comunidad existen activos de salud o recursos que pueden potenciar la capacidad de las personas, de las comunidades y de las poblaciones para mantener y generar salud y bienestar (salutogénesis).

[→ Ver Mapa de Activos de la Zona](#)

4. Resumen indicadores

La siguiente figura muestra, para una serie de indicadores, los valores de la zona (punto rojo) respecto a la media de Navarra (barra vertical) y respecto al conjunto de zonas básicas de Navarra. Para una descripción más detallada de los indicadores pueden consultarse sus [fichas individuales](#), disponibles en la página web del Observatorio.



Fuente de indicadores: 1 y 2: Mov. Natural Población; 3: Censo; 4: Enc. Pob. Activa (EPA); 5: Estad. Renta; 6-8: Padrón; 10-12: Enc. Nav. Juventud; 13: Enc. Cond. Vida; 14-15: Prest. Farmacéutica; 9, 16-19: Att. Primaria; 20-21: Inst. Salud Pub. Lab. Nav. (ISPLN)

Indicadores de la zona Pamplona según Zonificación Navarra 2000 (IEN). Número de valores representados en la figura: 7 en los indicadores 3, 4 y 13; 6 en los indicadores 10-12.

* Significativamente diferentes ($p < 0,05$) al resultado de Navarra (contraste realizado para indicadores de estilos de vida, morbilidad, sistema de salud y mortalidad).

1. Tasa bruta de natalidad (%); **2.** Tasa anual específica de fecundidad (%) en madres de 14-19 años; **3.** % de jóvenes de 20-24 años que no han completado estudios de 2º grado; **4.** % de parados respecto a la población activa, media de 4 trimestres; **5.** % de personas que viven en hogares cuya renta total equivalente está por debajo del umbral de pobreza (el 30% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo tomando la distribución de personas. Umbral de pobreza 2015: 5.150 €); **6.** % de personas ≥ 65 años en relación al total de personas de 15-64 años; **7 y 8.** % de personas ≥ 80 años que residen solas en relación al total de residentes de esta edad en viviendas familiares; **9.** % lactantes con lactancia materna (exclusiva o parcial) a los 170-190 días; **10.** % de jóvenes de 14 - 29 años con baja o nula actividad física tanto en su actividad habitual como en su tiempo libre; **11.** % jóvenes de 14-29 años con al menos un consumo de atracón o intensivo (*binge drinking*) en los últimos 30 días (4 o más UBEs en mujeres y 5 o más UBEs en hombres en dos horas); **12.** % de jóvenes de 14-29 años que consumen tabaco a diario; **13.** % de personas ≥ 15 años que consumen tabaco a diario; **14 y 15.** Tasa ajustada de personas con consumo de al menos 3 envases en el último año de alguno de estos grupos: N50B ansiolíticos, N05C hipnóticos y sedantes y/o N06A antidepresivos (T. bruta: mujeres 19,6 y hombres 9,1); **16.** Prevalencia ajustada de obesidad en población de 0 a 5 años definida según patrones de crecimiento infantil OMS (z-score ≥ +2); **17.** Prevalencia ajustada de personas ≥ 20 años con diabetes tipo 2 (T. bruta: 7,9); **18.** % de población con diabetes tipo 2 y con medición de hemoglobina glicosilada (HbA1c) en el último año; **19.** % de población con diagnóstico de hipertensión y medición de la tensión arterial (TA) en el último año; **20 y 21.** Nº medio de años que se espera que viva una persona de acuerdo a las tasas de mortalidad actuales.