



Zona Básica de Salud Artajona



Observatorio de Salud Pública de Navarra
Nafarroako Osasun Publikoaren Behatokia



1. Información general

	Valor Zona	Navarra
Población (2023):	5.435 hab. Mujeres: 47,9% Hombres: 52,1%	672.155 hab. 49,5% 50,5%
Edad media:	Mujeres: 45,5 Hombres: 44,8	46,3 años 43,2 años
Tasa de fecundidad:	36,3‰	-
Índice depend. juvenil:	26,5%	24,7%
Índice depend. senil:	39,3%	32,0%
Sobre - envejecimiento:	18,3%	17,2%
Pob. nacida extranjero:	17,7%	17,9%
Esperanza de vida:	Mujeres: 86,5 años Hombres: 80,1 años	86,8 años 81,3 años
Densidad de población:	25,0 hab/km ²	68,9 hab/km ²
Extensión:	217,36 km ²	9758,6 km ²
Zona POT a la que pertenece:	Zonas Medias (ver mapa)	
Municipios:	Artajona, Berbinzana, Larraga, Miranda de Arga.	

2. La comunidad y la salud

Factores sociodemográficos y ambientales. La zona de Artajona es una de las zonas básicas de salud con menor dato de nacimientos de madres menores de 20 años (0,0 %). Sin embargo, es una de las zonas con mayor porcentaje de hogares unipersonales de hombres de 80

o más años (26,8%). El resto de datos de factores sociodemográficos y ambientales se encuentran en torno a la media de Navarra.


Resultados en salud. La Zona Básica de Salud de Artajona se encuentra entre el 25,0% de zonas básicas con mejor resultado en personas hipertensas con medición de TA (65,7%) y en personas diabéticas con medición de HbA1c (83,2%). Sin embargo, es una de las zonas con peor resultado en consumo de ansiolíticos y antidepresivos (18,4% en mujeres y 10,5% en hombres), en exceso de peso en niñas de 6 a 9 años (32,5%) y en lactancia materna exclusiva a los 6 meses (25,9%).

Indicadores de encuesta. Los siguientes resultados ajustados* corresponden a las Zonas Medias (zonificación POT), a la que pertenece la zona básica de Artajona. Las Zonas Medias presentan los mejores resultados en sedentarismo en mujeres (22,3%), en bajo bienestar general en mujeres (21,3%), en consumo diario de tabaco en mujeres (12,9%) y en exceso de peso en hombres de 15 o más años (54,8%). Por el contrario, presenta el peor resultado en bajo bienestar general en hombres (34,2%).

***Nota:** Los indicadores de encuesta, y otros que así lo requieren, se han ajustado por sexo y edad para posibilitar la comparación entre zonas. Los indicadores brutos aparecen al pie de la siguiente página.

3. Resumen indicadores

La siguiente figura muestra, para una serie de indicadores, los valores de la zona (punto rojo) respecto a la media de Navarra (barra vertical) y respecto al conjunto de zonas básicas de Navarra. Para una descripción más detallada de los indicadores pueden consultarse sus [fichas individuales](#), disponibles en la página web del Observatorio.



Fuente de indicadores: 1: Mov. Natural Población; 2, 6-7: SIPNA; 3: Estad. Municipal de Pob. Activa; 4-5: Estad. Renta; 8: SIGPAC; 9, 24-27, 30-31: Atención Primaria; 10-21: ESyCV; 22-23: ISPLN; 28-29: Prestación Farmacéutica

Indicadores de la zona Zonas Medias (10-21) según Zonificación POT (NASTAT). Número de valores representados en la figura: 4.

* Significativamente diferentes ($p < 0,05$) al resultado de Navarra (contraste realizado para indicadores de estilos de vida, morbilidad y sistema de salud).

1. Tasa promedio anual específica de fecundidad (‰) de mujeres 14-19 años; **2.** % de jóvenes de 18-24 años sin título de graduado en ESO o equivalentes; **3.** % de parados respecto a la población activa; **4.** % de personas que viven en hogares cuya renta total equivalente está por debajo del umbral de pobreza severa; **5.** Índice Gini de desigualdad de ingresos representando mayor igualdad un dato más bajo; **6 y 7.** % de personas ≥ 80 años que residen solas en relación al total de residentes de esta edad en viviendas familiares; **8.** % de superficie forestal; **9.** % bebés con lactancia materna exclusiva a los 170-190 días; **10 y 11.** % ajustado de personas ≥ 15 años que consume diariamente frutas y verduras (T. bruta: mujeres 35,4 y hombres 27,5); **12 y 13.** % ajustado de personas ≥ 15 años sedentarias: declaran no hacer ejercicio (T. bruta: mujeres 22,8 y hombres 20,4); **14 y 15.** % ajustado de personas ≥ 15 años que consumen >100 g de alcohol a la semana (T. bruta: mujeres 6,3 y hombres 23,1); **16 y 17.** % ajustado de personas ≥ 15 años que consumen tabaco a diario (T. bruta: mujeres 11,9 y hombres 21,8); **18 y 19.** % ajustado de personas ≥ 15 años que presentan un bajo bienestar general (T. bruta: mujeres 21,9 y hombres 33,5); **20 y 21.** % ajustado de personas ≥ 15 años con exceso de peso: sobrepeso u obesidad (T. bruta: mujeres 38,3 y hombres 57,2); **22 y 23.** Prevalencia ajustada de exceso de peso – sobrepeso u obesidad – en población infantil de 6-9 años, definido según patrones de crecimiento infantil OMS (T. bruta: mujeres 31,9 y hombres 32,8); **24 y 25.** Prevalencia ajustada de personas ≥ 20 años con diabetes tipo 2 (T. bruta: mujeres 6,4 y hombres 9,8); **26 y 27.** % ajustado de personas ≥ 65 años con ≥ 3 patologías (T. bruta: mujeres 8,4 y hombres 12,8); **28 y 29.** % ajustado de personas con consumo de ≥ 3 envases en el último año de alguno de estos grupos: N50B ansiolíticos, N05C hipnóticos y sedantes y/o N06A antidepresivos (T. bruta: mujeres 21,8 y hombres 11,5); **30.** % de población > 14 años con diabetes tipo 2 que tiene medición de hemoglobina glicosilada (HbA1c) en el último año; **31.** % de población > 14 años con diagnóstico de hipertensión que tienen medición de la tensión arterial (TA) en el último año.