



Zona Básica de Salud Valtierra-Cadreita



Observatorio de Salud Pública de Navarra
Nafarroako Osasun Publikoaren Behatokia



Fuente: SITNA-ISPLN



1. Información general

	Valor Zona	Navarra
Población (2023):	13.460 hab. Mujeres: 48,7% Hombres: 51,3%	672.155 hab. 49,5% 50,5%
Edad media:	Mujeres: 44,3 Hombres: 42,8	46,3 años 43,2 años
Tasa de fecundidad:	110‰	-
Índice depend. juvenil:	27,2%	24,7%
Índice depend. senil:	32,7%	32,0%
Sobre - envejecimiento:	20,6%	17,2%
Pob. nacida extranjero:	25,3%	17,9%
Esperanza de vida:	Mujeres: 85,8 años Hombres: 80 años	86,8 años 81,3 años
Densidad de población:	61,4 hab/km ²	68,9 hab/km ²
Extensión:	218,93 km ²	9758,6 km ²
Zona POT a la que pertenece:	Eje del Ebro (ver mapa)	
Municipios:	Arguedas, Cadreita, Milagro, Valtierra, Villafranca.	

2. La comunidad y la salud

Factores sociodemográficos y ambientales. La zona de Valtierra-Cadreita es una de las zonas básicas de salud con mayor porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años sin título de graduado en ESO (12,3%), mayor porcentaje de hogares unipersonales de mujeres de 80 o más años

(44,4%) y mayor índice Gini de desigualdad de ingresos (33,8%).


Resultados en salud. Zona Básica de Salud de Valtierra-Cadreita se encuentra entre el 25,0% de las zonas básicas con mejores resultados en lactancia materna exclusiva a los 6 meses (44,0%). Por el contrario, se sitúa entre el 25% de zonas básicas con peores resultados de Navarra en personas con 3 o más patologías crónicas (6,6% en mujeres y 12,7% en hombres), en mujeres diagnosticadas de diabetes tipo 2 (7,1%) y en mujeres con consumo de ansiolíticos y antidepresivos (17,7%).

Indicadores de encuesta. Los siguientes resultados ajustados* corresponden a la zona Eje del Ebro (zonificación POT), a la que pertenece la zona básica de Valtierra-Cadreita. El Eje del Ebro presenta el mejor resultado en consumo de alcohol semanal (21,9% en hombres y 5,1% en mujeres), en consumo diario de frutas y verduras en hombres (28,0%) y en bajo bienestar general en hombres (16,7%). Sin embargo, presenta los peores resultados en sedentarismo en hombres (25,4%), en exceso de peso en hombres de 15 o más años (66,9%) y en consumo de tabaco en mujeres (14,4%).

***Nota:** Los indicadores de encuesta, y otros que así lo requieren, se han ajustado por sexo y edad para posibilitar la comparación entre zonas. Los indicadores brutos aparecen al pie de la siguiente página.

3. Resumen indicadores

La siguiente figura muestra, para una serie de indicadores, los valores de la zona (punto rojo) respecto a la media de Navarra (barra vertical) y respecto al conjunto de zonas básicas de Navarra. Para una descripción más detallada de los indicadores pueden consultarse sus [fichas individuales](#), disponibles en la página web del Observatorio.



Fuente de indicadores: 1: Mov. Natural Población; 2, 6-7: SIPNa; 3: Estad. Municipal de Pob. Activa; 4-5: Estad. Renta; 8: SIGPAC; 9, 24-27, 30-31: Atención Primaria; 10-21: ESyCV; 22-23: ISPLN; 28-29: Prestación Farmacéutica

Indicadores de la zona Eje del Ebro (10-21) según Zonificación POT (NASTAT). Número de valores representados en la figura: 4.

* Significativamente diferentes ($p < 0,05$) al resultado de Navarra (contraste realizado para indicadores de estilos de vida, morbilidad y sistema de salud).

1. Tasa promedio anual específica de fecundidad (‰) de mujeres 14-19 años; 2. % de jóvenes de 18-24 años sin título de graduado en ESO o equivalentes; 3. % de parados respecto a la población activa; 4. % de personas que viven en hogares cuya renta total equivalente está por debajo del umbral de pobreza severa; 5. Índice Gini de desigualdad de ingresos representando mayor igualdad un dato más bajo; 6 y 7. % de personas ≥ 80 años que residen solas en relación al total de residentes de esta edad en viviendas familiares; 8. % de superficie forestal; 9. % bebés con lactancia materna exclusiva a los 170-190 días; 10 y 11. % ajustado de personas ≥ 15 años que consume diariamente frutas y verduras (T. bruta: mujeres 33,5 y hombres 27,6); 12 y 13. % ajustado de personas ≥ 15 años sedentarias: declaran no hacer ejercicio (T. bruta: mujeres 32,7 y hombres 24,9); 14 y 15. % ajustado de personas ≥ 15 años que consumen >100 g de alcohol a la semana (T. bruta: mujeres 5,2 y hombres 21); 16 y 17. % ajustado de personas ≥ 15 años que consumen tabaco a diario (T. bruta: mujeres 13,3 y hombres 18,5); 18 y 19. % ajustado de personas ≥ 15 años que presentan un bajo bienestar general (T. bruta: mujeres 28,2 y hombres 17,7); 20 y 21. % ajustado de personas ≥ 15 años con exceso de peso: sobrepeso u obesidad (T. bruta: mujeres 37,5 y hombres 66,9); 22 y 23. Prevalencia ajustada de exceso de peso – sobrepeso u obesidad – en población infantil de 6-9 años, definido según patrones de crecimiento infantil OMS (T. bruta: mujeres 26,5 y hombres 30,7); 24 y 25. Prevalencia ajustada de personas ≥ 20 años con diabetes tipo 2 (T. bruta: mujeres 8,2 y hombres 9,3); 26 y 27. % ajustado de personas ≥ 65 años con ≥ 3 patologías (T. bruta: mujeres 9,9 y hombres 14,1); 28 y 29. % ajustado de personas con consumo de ≥ 3 envases en el último año de alguno de estos grupos: N50B ansiolíticos, N05C hipnóticos y sedantes y/o N06A antidepresivos (T. bruta: mujeres 19,7 y hombres 8,2); 30. % de población > 14 años con diabetes tipo 2 que tiene medición de hemoglobina glicosilada (HbA1c) en el último año; 31. % de población > 14 años con diagnóstico de hipertensión que tienen medición de la tensión arterial (TA) en el último año.