



Zona Básica de Salud Elizondo



Observatorio de Salud Pública de Navarra
Nafarroako Osasun Publikoaren Behatokia



1. Información general

	Valor Zona	Navarra
Población (2023):	8.433 hab. Mujeres: 49,5% Hombres: 50,5%	672.155 hab. 49,5% 50,5%
Edad media:	Mujeres: 46,2 Hombres: 44,2	46,3 años 43,2 años
Tasa de fecundidad:	48%	-
Índice depend. juvenil:	25,2%	24,7%
Índice depend. senil:	37,2%	32,0%
Sobre - envejecimiento:	16,7%	17,2%
Pob. nacida extranjero:	11,8%	17,9%
Esperanza de vida:	Mujeres: 84,8 años Hombres: 78,5 años	86,8 años 81,3 años
Densidad de población:	21,6 hab/km ²	68,9 hab/km ²
Extensión:	390 km ²	9758,6 km ²
Zona POT a la que pertenece:	Navarra Atlántica (ver mapa)	
Municipios:	Baztan, Urdazubi/Urdax, Zugarramurdi.	

Resultados en salud. La Zona Básica de Salud de Elizondo se encuentra entre el 25,0% de zonas básicas con mejor resultado en mujeres diagnosticadas de diabetes tipo 2 (4,3%) y en consumo de ansiolíticos y antidepresivos (13,3% en mujeres y 7,3% en hombres). Por otro lado, es de las zonas con peores resultados en exceso de peso en niñas de 6 a 9 años (35,5%, calculado de manera conjunta con la ZBS de Ultzama).

Indicadores de encuesta. Los siguientes resultados ajustados* corresponden a la zona Navarra Atlántica-Pirineo (zonificación POT), a la que pertenece la zona básica de Elizondo. Navarra Atlántica-Pirineo presenta el mejor resultado en consumo diario de frutas y verduras en mujeres (37,1%) y en consumo de tabaco diario en hombres (16,8%). Por el contrario, presenta los peores resultados en cuatro indicadores de encuesta para las mujeres: sedentarismo (32,1%), exceso de peso en personas de 15 o más años (44,0%), consumo de alcohol semanal (11,8%) y bajo bienestar general (35,2%).


***Nota:** Los indicadores de encuesta, y otros que así lo requieren, se han ajustado por sexo y edad para posibilitar la comparación entre zonas. Los indicadores brutos aparecen al pie de la siguiente página.

2. La comunidad y la salud

Factores sociodemográficos y ambientales. La zona de Elizondo es una de las zonas básicas de salud con menor tasa de desempleo (5,6%). Por otra parte, es una de las zonas con mayor superficie forestal (42,4%). El resto de datos de factores sociodemográficos y ambientales se encuentran en torno a la media de Navarra.

3. Resumen indicadores

La siguiente figura muestra, para una serie de indicadores, los valores de la zona (punto rojo) respecto a la media de Navarra (barra vertical) y respecto al conjunto de zonas básicas de Navarra. Para una descripción más detallada de los indicadores pueden consultarse sus [fichas individuales](#), disponibles en la página web del Observatorio.



Fuente de indicadores: 1: Mov. Natural Población; 2, 6-7: SIPNa; 3: Estad. Municipal de Pob. Activa; 4-5: Estad. Renta; 8: SIGPAC; 9, 24-27, 30-31: Atención Primaria; 10-21: ESyCV; 22-23: ISPLN; 28-29: Prestación Farmacéutica

Indicadores de la zona Navarra Atlántica (10-21) según Zonificación POT (NASTAT). Número de valores representados en la figura: 4.

* Significativamente diferentes ($p < 0,05$) al resultado de Navarra (contraste realizado para indicadores de estilos de vida, morbilidad y sistema de salud).

1. Tasa promedio anual específica de fecundidad (‰) de mujeres 14-19 años; **2.** % de jóvenes de 18-24 años sin título de graduado en ESO o equivalentes; **3.** % de parados respecto a la población activa; **4.** % de personas que viven en hogares cuya renta total equivalente está por debajo del umbral de pobreza severa; **5.** Índice Gini de desigualdad de ingresos representando mayor igualdad un dato más bajo; **6 y 7.** % de personas ≥ 80 años que residen solas en relación al total de residentes de esta edad en viviendas familiares; **8.** % de superficie forestal; **9.** % bebés con lactancia materna exclusiva a los 170-190 días; **10 y 11.** % ajustado de personas ≥ 15 años que consume diariamente frutas y verduras (T. bruta: mujeres 38,9 y hombres 25); **12 y 13.** % ajustado de personas ≥ 15 años sedentarias: declaran no hacer ejercicio (T. bruta: mujeres 31,5 y hombres 23,1); **14 y 15.** % ajustado de personas ≥ 15 años que consumen >100 g de alcohol a la semana (T. bruta: mujeres 10,8 y hombres 24,9); **16 y 17.** % ajustado de personas ≥ 15 años que consumen tabaco a diario (T. bruta: mujeres 12,9 y hombres 15,3); **18 y 19.** % ajustado de personas ≥ 15 años que presentan un bajo bienestar general (T. bruta: mujeres 33,3 y hombres 17,2); **20 y 21.** % ajustado de personas ≥ 15 años con exceso de peso: sobrepeso u obesidad (T. bruta: mujeres 45,4 y hombres 58,4); **22 y 23.** Prevalencia ajustada de exceso de peso – sobrepeso u obesidad – en población infantil de 6-9 años, definido según patrones de crecimiento infantil OMS (T. bruta: mujeres 35,7 y hombres 31,9); **24 y 25.** Prevalencia ajustada de personas ≥ 20 años con diabetes tipo 2 (T. bruta: mujeres 5,4 y hombres 8,7); **26 y 27.** % ajustado de personas ≥ 65 años con ≥ 3 patologías (T. bruta: mujeres 7,8 y hombres 12,1); **28 y 29.** % ajustado de personas con consumo de ≥ 3 envases en el último año de alguno de estos grupos: N50B ansiolíticos, N05C hipnóticos y sedantes y/o N06A antidepresivos (T. bruta: mujeres 16,2 y hombres 7,7); **30.** % de población > 14 años con diabetes tipo 2 que tiene medición de hemoglobina glicosilada (HbA1c) en el último año; **31.** % de población > 14 años con diagnóstico de hipertensión que tienen medición de la tensión arterial (TA) en el último año.