





Fuente: SITNA-ISPLN



1. Argibide orokorrak

	Eskualdeko balioa	Nafarroa
Biztanleria (2023):	4.862 Emak.: %48 Giz.: %52	672.155 %49,5 %50,5
Batez besteko adina:	Emak.: 47,9 Giz.: 46,5	46,3 43,2
Ugalkortasun-tasa:	%19	-
Gazteen mendekotasunaren indizea:	% 22,3	%24,7
Zahartzaroko mendekotasun indizea:	%41,8	%32,0
Gainzahartzea:	%19,8	%17,2
Atzerrian jaiotako biztanleak:	%8,2	%17,9
Bizi itxaropena:	Emak.: 87,1 Giz.: 82	86,8 81,3
Biztanleria-densitate:	16,8 biz.km ²	68,9 biz.km ²
Zabalera:	287,75 km ²	9758,6 km ²
Zer Eskualdetakoa den:	Erdialdeko Eskualdeak (ikus mapa)	
Udalerriak:	Abárzuza, Guesálaz, Lezáun, Oteiza, Salinas de Oro, Villatuerta, Yerri (excepto: Bearin)	

2. Komunitatea eta osasuna

Faktore soziodemografikoak eta ingurumenekoak. Villatuertako osasun-eskualde oinarrizkoan, beste eskualdeekin alderatuta, bakarrik bizi diren 80 urte edo gehiagoko emakumezkoen etxeen ehunekoa (% 25,8) eta 20 urtetik beherako ama duten jaioberrien tasa (% 0,0)

txikiak dira. Hala ere, diru-sarreraren desberdintasuneko Gini indizea (% 34,3) handia da.


Osasunari dagozkion emaitzak. Villatuertako osasun-eskualde oinarrizkoa eskualdeen laurden hoberenean dago datu hauetan: soilik amagandik edoskitzen duten 6 hilabeteko haurrak (% 46,2), 2 motako diabetesa diagnostikaturik duten emakumeak (% 3,8), 3 patologia kroniko edo gehiago dituzten gizonak (% 9,7), TA-ren neurrak duten hipertentsoak (% 60,8) eta pisu gehiegi duten 6tik 9 urtera bitarteko haurrak (nesken % 18,8 eta mutilen % 27,0, bi datuak Antzin-Ameskoako osasun-eskualde oinarrizkoarekin batera kalkulaturik). Gainera, emaitzarik hoberena du honetan: 2 motako diabetesa diagnostikaturik duten gizonak (% 6,4).

Inkesta-adierazleak. Hurrengo emaitza doituak* Erdialdeko Eremuei dagozkie (LAP zonifikazioa); Villatuertako eskualde oinarrizkoa zona horretan dago. Erdialdeko Eremuek emaitzarik onena dute zenbait adierazletan: bizimodu sedentarioa izatea (emakumeek: % 22,3), ongizate txikia izatea oro har (emakumeek: % 21,3), tabakoa egunero erretzea (emakumeek: % 12,9) eta gehiegizko pisua izatea (15 urteko edo gehiagoko gizonak: % 54,8). Aitzitik, emaitzarik txarra du adierazle batean: ongizate txikia izatea (gizonak: % 34,2).

***Oharra:** Inkesta-adierazleak eta hala eskatzen duten beste adierazle batzuk sexuaren eta adinaren arabera doitu dira, eskualdeen arteko konparazioa egin ahal izateko. Adierazle gordinak hurrengo orrialdearen behealdean agertzen dira.

3. Adierazleen laburpena

Ondoko irudian agertzen dira adierazle sorta bati dagozkion eskualdeko balioak (puntu gorria) Nafarroako batez bestekoarekin alderaturik (barra bertikala) eta Nafarroako eskualde oinarritzkoen multzo osoarekin alderaturik. Adierazleen deskribapen zehatzagorik nahi izanez gero, haien [banakako fitxak](#) ikus daitezke Behatokiaren webgunean.



Adierazleen iturria: 1: Biztan. Mug. Nat.; 2, 6-7: SIPNa (Nafarroako Biztanleriaren Sistema Integratua); 3: Biztan. Akt. Ud. Est.; 4-5: Errenta. Est.; 8: SIGPAC (Nekazaritzako Lurzati en Informazio Geografikoko Sistema); 10, 24-27, 30-31: Oinarritzko osasun-laguntza; 10-21: ESyCV (Gizarte eta Bizi Baldintzen gaineko Inkesta); 22-23: NOPLOI; 28-29: Farmazia prestazioa

Nafarroa Atlantikoaren adierazleak (10-21) LAP zonifikazioa (NASTAT). Irudian adierazitako balioen kopurua: 4.

* Nabarmen desberdinak ($p < 0,05$) Nafarroako emaitzarekin alderatuz (bizimodu en, morbiditatearen eta osasun sistemaren adierazleentarako eginiko kontrastea).

1. Urteko batez besteko ugalkortasun-tasa berariazkoa (%) 14 eta 19 urte bitarteko emakumeetan; 2. DBHko graduatu-titulurik edo haren balioarekin gabeko 18tik 24 urtera arteko gazteen %; 3. Langabetuen % biztanleria aktiboaren aldean; 4. Bizikide en errentaren baturak pobrezia larriaren atalasetik behera egiten duen etxeetan bizi diren pertsonen %; 5. Diru-sarrer en desberdintasunaren Gini indizea, datu baxuagoak berdintasun handiagoa adierazten du; 6 eta 7. Bakarrik bizi diren 80 urte edo gehiagoko pertsonen %, adin horretan familia-etxebizitzetan bizi diren guztien aldean; 8. Baso-azalaren %; 9. 170-190 egunetara soilik amagandik edoskitzen duten haurrak %; 10 eta 11. Frutak eta barazkiak egunero jaten dituzten pertsonen % doitua (t. gordina: emakumeak 35,4 eta gizonak 27,5); 12 eta 13. 15 urteko edo gehiagoko sedentario en % doitua: ariketarik egiten ez dutela diote (t. gordina: emakumeak 22,8 eta gizonak 20,4); 14 eta 15. Aste en 100 g alkohol baino gehiago hartzen duten en % doitua (t. gordina: emakumeak 6,3 eta gizonak 23,1); 16 eta 17. Tabakoa egunero hartzen duten 15 urte edo gehiagoko pertsonen % doitua (t. gordina: emakumeak 11,9 eta gizonak 21,8); 18 eta 19. Ongizate orokor baxua duten 15 urte edo gehiagoko pertsonen % doitua (t. gordina: emakumeak 21,9 eta gizonak 33,5); 20 eta 21. Pisu gehiegi, gehiegizko pisua edo obesitatea duten 15 urte edo gehiagoko pertsonen % doitua (t. gordina: emakumeak 38,3 eta gizonak 57,2); 22 eta 23. Pisu gehiegi -gehiiegizko pisua edo obesitatea duten- 6tik 9 urtera arteko haurren prebalentzia doitua, OMEK haurren hazkuntzarako emaniko eredu en arabera (t. gordina: emakumeak 19,2 eta gizonak 27,1); 24 eta 25. 2 motako diabetesa duten 20 urte edo gehiagoko pertsonen prebalentzia doitua (t. gordina: emakumeak 4,9 eta gizonak 7,5); 26 eta 27. 3 patologia edo gehiago dituzten 65 urteko edo gehiagoko pertsonen % doitua (t. gordina: emakumeak 8 eta gizonak 11,1); 28 eta 29. Azken urte en, multzo hauetako bateko 3 ontzi edo gehiago hartu dituzten pertsonen % doitua: N50B antsiolitikoak, N05C hipnotikoak eta lasaigarriak eta/edo N06A antidepresiboak (t. gordina: emakumeak 20,3 eta gizonak 10,2); 30. 2 motako diabetesa izanik, azken urte en hemoglobina glikosilatua (HbA1c-a) neurtu duen biztanleriaren %; 31. Azken urte en hipertentzioa diagnostikatu eta tentsio arteriala (TA) neurtu zaion biztanleriaren %.