


Osasun Eskualde Oinarrizkoa


Azpilagaña



Observatorio de Salud Pública de Navarra
Nafarroako Osasun Publikoaren Behatokia



Fuente: SITNA-ISPLN



1. Argibide orokorrak

	Eskualdeko balioa	Nafarroa
Biztanleria (2023):	13.152 Emak.: %54,3 Giz.: %45,7	672.155 %49,5 %50,5
Batez besteko adina:	Emak.: 52,7 Giz.: 48	46,3 43,2
Ugalkortasun-tasa:	%76,3	-
Gazteen mendekotasunaren indizea:	% 16,4	%24,7
Zahartzaroko mendekotasun indizea:	%57,6	%32,0
Gainzahartzea:	%22,6	%17,2
Atzerritan jaiotako biztanleak:	%20,4	%17,9
Bizi itxaropena:	Emak.: 87,8 Giz.: 82,3	86,8 81,3
Biztanleria-densitate:	13733,5 biz.km ²	68,9 biz.km ²
Zabalera:	0,96 km ²	9758,6 km ²
Zer Eskualdetakoa den:	Eremu Zentrala (ikus mapa)	
Udalerriak:	Pamplona/Iruña (distrito-sección: 04-001 a 04-003, 04-011, 04-015 a 04-017, 04-021 y 04-025)	

2. Komunitatea eta osasuna

Faktore soziodemografikoak eta ingurumenekoak. Aspilagaña osasun-eskualde oinarrizkoan, beste eskualdeekin alderatuta, bakarrik bizi diren 80 urte edo gehiagoko gizonezkoen etxeen ehunekoa (% 15,7) txikia da. Hala ere, baso-azaleraren ehunekoa (% 0,2) txikia da.

Gainerako adierazle soziodemografikoak eta ingurumenekoak Nafarroako batezbestekoaren inguruan daude.


Osasunari dagozkion emaitzak. Aspilagaña osasun-eskualde oinarrizkoa eskualdeen laurden hoberenean dago datu hauetan: 2 motako diabetesa diagnostikaturik duten emakumeen prebalentzia (% 4,4), 3 patologia kroniko edo gehiago dituzten emakumeak (% 5,1), antsiolitikoak eta antidepresiboak kontsumitzen dituzten emakumeak (% 14,7) eta HbA1c-ren neurketa duten diabetikoak (% 61,9). Hala ere, emaitza txarrak ditu datu hauetan: soilik amagandik edoskitzen duten 6 hilabeteko haurrak (% 24,6) eta pisu gehiegi duten 6tik 9 urtera bitarteko mutilak (% 35,2).

Inkesta-adierazleak. Hurrengo emaitza doitu* hauek Eremu Zentrala eskualdeari dagozkio (LAP zonifikazioa); Aspilagaña osasun-eskualde oinarrizkoa zona horretan dago. Eremu Zentralak emaitzarik onena du zenbait adierazletan: gehiegizko pisua izatea (15 urteko edo gehiagoko emakumeek: % 32,3) eta bizimodu sedentarioa izatea (gizonek: % 16,4). Aitzitik, emaitzarik txarrena du hiru adierazletan: frutak eta barazkiak egunero jatea (emakumeek: % 30,6; gizonek: % 24,5), tabakoa egunero erretzea (gizonek: % 24,9) eta alkohola astero edatea (gizonek: % 25,0).

***Oharra:** Inkesta-adierazleak eta hala eskatzen duten beste adierazle batzuk sexuaren eta adinaren arabera doitu dira, eskualdeen arteko konparazioa egin ahal izateko. Adierazle gordinak hurrengo orrialdearen behealdean agertzen dira.

3. Adierzleen laburpena

Ondoko irudian agertzen dira adierazle sorta bati dagozkion eskualdeko balioak (puntu gorria) Nafarroako batez bestekoarekin alderaturik (barra bertikala) eta Nafarroako eskualde oinarritzkoen multzo osoarekin alderaturik. Adierazleen deskribapen zehatzagorik nahi izanez gero, haien [banakako fitxak](#) ikus daitezke Behatokiaren webgunean.



Adierazleen iturria: 1: Biztan. Mug. Nat.; 2, 6-7: SIPNa (Nafarroako Biztanleriaren Sistema Integratua); 3: Biztan. Akt. Ud. Est.; 4-5: Errenta. Est.; 8: SIGPAC (Nekazaritzako Lurzati en Informazio Geografikoko Sistema); 10, 24-27, 30-31: Oinarritzko osasun-laguntza; 10-21: ESyCV (Gizarte eta Bizi Baldintzen gaineko Inkesta); 22-23: NOPLOI; 28-29: Farmazia prestazioa
Nafarroa Atlantikoaren adierazleak (10-21) LAP zonifikazioa (NASTAT). Irudian adierazitako balioen kopurua: 4.
* Nabarmen desberdinak (p < 0,05) Nafarroako emaitzarekin alderatuz (bizimodu en, morbiditatearen eta osasun sistemaren adierazleentarako eginiko kontrastea).

1. Urteko batez besteko ugalkortasun-tasa berariazkoa (%) 14 eta19 urte bitarteko emakumeetan; **2.** DBHko graduatu-titulurik edo haren baliokiderik gabeko 18tik 24 urtera arteko gazteen %; **3.** Langabetuen % biztanleria aktiboaren aldean; **4.** Bizikide en errentaren baturak pobrezia larriaren atalasetik behera egiten du en etxeetan bizi diren pertsonen %; **5.** Diru-sarrer en desberdintasunaren Gini indizea, datu baxuagoak berdintasun handiagoa adierazten du; **6 eta 7.** Bakarrik bizi diren 80 urte edo gehiagoko pertsonen %, adin horretan familia-etxebizitzetan bizi diren guztien aldean; **8.** Baso-azalaren %; **9.** 170-190 egunetara soilik amagandik edoskitzen duten haurrak %; **10 eta 11.** Frutak eta barazkiak egunero jaten dituzten pertsonen % doitua (t. gordina: emakumeak 32,1 eta gizonak 24,4); **12 eta 13.** 15 urteko edo gehiagoko sedentario en % doitua: ariketarik egiten ez dutela diote (t. gordina: emakumeak 23,3 eta gizonak 16,5); **14 eta 15.** Aste en 100 g alkohol baino gehiago hartzen dutenen % doitua (t. gordina: emakumeak 10 eta gizonak 24,5); **16 eta 17.** Tabakoa egunero hartzen duten 15 urte edo gehiagoko pertsonen % doitua (t. gordina: emakumeak 13,3 eta gizonak 25,2); **18 eta 19.** Ongizate orokor baxua duten 15 urte edo gehiagoko pertsonen % doitua (t. gordina: emakumeak 31,6 eta gizonak 24); **20 eta 21.** Pisu gehiagi, gehiegizko pisua edo obesitatea duten 15 urte edo gehiagoko pertsonen % doitua (t. gordina: emakumeak 31,8 eta gizonak 57,5); **22 eta 23.** Pisu gehiagi -gehiiegizko pisua edo obesitatea duten- 6tik 9 urtera arteko haurren prebalentzia doitua, OMEK haurren hazkuntzarako emaniko eredu en arabera (T. gordina: emakumeak 30,2 eta gizonak 34,7); **24 eta 25.** 2 motako diabetesa duten 20 urte edo gehiagoko pertsonen prebalentzia doitua (T. gordina: emakumeak 6,4 eta gizonak 9,9); **26 eta 27.** 3 patologia edo gehiago dituzten 65 urteko edo gehiagoko pertsonen % doitua (t. gordina: emakumeak 7,2 eta gizonak 13,6); **28 eta 29.** Azken urte en, multzo hauetako bateko 3 ontzi edo gehiago hartu dituzten pertsonen % doitua: N50B antsiolitikoak, N05C hipnotikoak eta lasaigarriak eta/edo N06A antidepresiboak (t. gordina: emakumeak 19,9 eta gizonak 9,4); **30.** 2 motako diabetesa izanik, azken urte en hemoglobina glikosilatua (HbA1c-a) neurtu du en biztanleriaren %; **31.** Azken urte en hipertentzioa diagnostikatu eta tentsio arteriala (TA) neurtu zaion biztanleriaren %.