



# Zona Básica de Salud Isaba / Izaba



Observatorio de Salud Pública de Navarra  
Nafarroako Osasun Publikoaren Behatokia



Fuente: SITNA-ISPLN



## 1. Información general

	Valor Zona	Navarra
Población (2023):	1.277 hab. Mujeres: 46,8% Hombres: 53,2%	672.155 hab. 49,5% 50,5%
Edad media:	Mujeres: 55,3 Hombres: 53,3	46,3 años 43,2 años
Tasa de fecundidad:	6,3‰	-
Índice depend. juvenil:	13,6%	24,7%
Índice depend. senil:	61,8%	32,0%
Sobre - envejecimiento:	27,3%	17,2%
Pob. nacida extranjero:	7,3%	17,9%
Esperanza de vida:	Mujeres: 87,1 años Hombres: 82,1 años	86,8 años 81,3 años
Densidad de población:	2,9 hab/km <sup>2</sup>	68,9 hab/km <sup>2</sup>
Extensión:	438,97 km <sup>2</sup>	9758,6 km <sup>2</sup>
Zona POT a la que pertenece:	Pirineo ( <a href="#">ver mapa</a> )	
Municipios:	Burgui, Castillo-Nuevo, Garde, Isaba, Roncal, Urzainqui, Uztarroz, Vidangoz.	

## 2. La comunidad y la salud

**Factores sociodemográficos y ambientales.** La zona de Isaba / Izaba es una de las zonas básicas de salud con menor tasa de desempleo (5,5%), menor porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años sin título de graduado en ESO (1,9%), menor dato de nacimientos de madres menores

de 20 años (0,0‰) y mayor superficie forestal (61,9%). Sin embargo, es una de las zonas con mayor índice Gini de desigualdad de ingresos (35,5%) y además presenta el mayor porcentaje de hogares unipersonales de hombres de 80 o más años (39,2%).


**Resultados en salud.** La Zona Básica de Salud de Isaba / Izaba se encuentra entre el 25,0% de zonas básicas con mejor resultado en prevalencia de mujeres diagnosticadas de diabetes tipo 2 (3,3%), en personas diabéticas con medición de HbA1c (97,2%), en consumo de ansiolíticos y antidepresivos en hombres (7,8%) y en pacientes con 3 o más patologías crónicas (4,3% en mujeres y 7,6% en hombres). Además, Isaba / Izaba es la Zona Básica de Salud con el mejor resultado en personas hipertensas con medición de TA (86,4%). El resto de indicadores de resultados en salud se encuentran en torno a la media de Navarra.

**Indicadores de encuesta.** Los siguientes resultados ajustados\* corresponden a la zona Navarra Atlántica-Pirineo (zonificación POT), a la que pertenece la zona básica de Isaba. Navarra Atlántica-Pirineo presenta el mejor resultado en consumo diario de frutas y verduras en mujeres (37,1%) y en consumo de tabaco diario en hombres (16,8%). Por el contrario, presenta los peores resultados en cuatro indicadores de encuesta para las mujeres: sedentarismo (32,1%), exceso de peso en personas de 15 o más años (44,0%), consumo de alcohol semanal (11,8%) y bajo bienestar general (35,2%).

**\*Nota:** Los indicadores de encuesta, y otros que así lo requieren, se han ajustado por sexo y edad para posibilitar la comparación entre zonas. Los indicadores brutos aparecen al pie de la siguiente página.

### 3. Resumen indicadores

La siguiente figura muestra, para una serie de indicadores, los valores de la zona (punto rojo) respecto a la media de Navarra (barra vertical) y respecto al conjunto de zonas básicas de Navarra. Para una descripción más detallada de los indicadores pueden consultarse sus [fichas individuales](#), disponibles en la página web del Observatorio.



**Fuente de indicadores:** 1: Mov. Natural Población; 2, 6-7: SIPNa; 3: Estad. Municipal de Pob. Activa; 4-5: Estad. Renta; 8: SIGPAC; 9, 24-27, 30-31: Atención Primaria; 10-21: ESyCV; 22-23: ISPLN; 28-29: Prestación Farmacéutica

# Indicadores de la zona Pirineo (10-21) según Zonificación POT (NASTAT). Número de valores representados en la figura: 4.

\* Significativamente diferentes (p < 0,05) al resultado de Navarra (contraste realizado para indicadores de estilos de vida, morbilidad y sistema de salud).

**1.** Tasa promedio anual específica de fecundidad (‰) de mujeres 14-19 años; **2.** % de jóvenes de 18-24 años sin título de graduado en ESO o equivalentes; **3.** % de parados respecto a la población activa; **4.** % de personas que viven en hogares cuya renta total equivalente está por debajo del umbral de pobreza severa; **5.** Índice Gini de desigualdad de ingresos representando mayor igualdad un dato más bajo; **6 y 7.** % de personas ≥ 80 años que residen solas en relación al total de residentes de esta edad en viviendas familiares; **8.** % de superficie forestal; **9.** % bebés con lactancia materna exclusiva a los 170-190 días; **10 y 11.** % ajustado de personas ≥ 15 años que consume diariamente frutas y verduras (T. bruta: mujeres 38,9 y hombres 25); **12 y 13.** % ajustado de personas ≥ 15 años sedentarias: declaran no hacer ejercicio (T. bruta: mujeres 31,5 y hombres 23,1); **14 y 15.** % ajustado de personas ≥ 15 años que consumen >100 g de alcohol a la semana (T. bruta: mujeres 10,8 y hombres 24,9); **16 y 17.** % ajustado de personas ≥ 15 años que consumen tabaco a diario (T. bruta: mujeres 12,9 y hombres 15,3); **18 y 19.** % ajustado de personas ≥ 15 años que presentan un bajo bienestar general (T. bruta: mujeres 33,3 y hombres 17,2); **20 y 21.** % ajustado de personas ≥ 15 años con exceso de peso: sobrepeso u obesidad (T. bruta: mujeres 45,4 y hombres 58,4); **22 y 23.** Prevalencia ajustada de exceso de peso – sobrepeso u obesidad – en población infantil de 6-9 años, definido según patrones de crecimiento infantil OMS (T. bruta: mujeres 29,8 y hombres 31,3); **24 y 25.** Prevalencia ajustada de personas ≥ 20 años con diabetes tipo 2 (T. bruta: mujeres 5,8 y hombres 13,3); **26 y 27.** % ajustado de personas ≥ 65 años con ≥ 3 patologías (T. bruta: mujeres 7,1 y hombres 9); **28 y 29.** % ajustado de personas con consumo de ≥ 3 envases en el último año de alguno de estos grupos: N50B ansiolíticos, N05C hipnóticos y sedantes y/o N06A antidepresivos (T. bruta: mujeres 21,4 y hombres 10,4); **30.** % de población > 14 años con diabetes tipo 2 que tiene medición de hemoglobina glicosilada (HbA1c) en el último año; **31.** % de población > 14 años con diagnóstico de hipertensión que tienen medición de la tensión arterial (TA) en el último año.