Zona Básica de Salud
Auritz / Burguete

Observatorio de Salud Pública de Navarra
Nafarroako Osasun Publikoaren Behatokia





1. Información general

	Valor Zona	Navarra
Población (**2023**):	2.210 hab. Mujeres: 45,1% Hombres: 54,9%	672.155 hab. 49,5% 50,5%
Edad media:	Mujeres: 51,8 Hombres: 50	46,3 años 43,2 años
Tasa de fecundidad:	9,7‰	-
Índice depend. juvenil:	17,7%	24,7%
Índice depend. senil:	51%	32,0%
Sobre - envejecimiento:	19%	17,2%
Pob. nacida extranjero:	5,9%	17,9%
Esperanza de vida:	Mujeres: 88,8 años Hombres: 80,9 años	86,8 años 81,3 años
Densidad de población:	5,2 hab/km^2	68,9 hab/km^2
Extensión:	424,13 km^2	9758,6 km^2
Zona POT a la que pertenece:	Pirineo (ver mapa)	
Municipios: Abaurreagaina/Abaurrea Alta, Abaurrepea/Abaurrea Baja, Aria, Aribe, Auritz/Burguete, Erro, Garaioa, Garralda, Orbaitzeta, Orbara, Orreaga/Roncesvalles, Luzaide/Valcarlos, Hiriberri/Villanueva de Aezkoa.		

2. La comunidad y la salud

Factores sociodemográficos y ambientales. La zona de Auritz / Burguete es una de las zonas básicas de salud con menor porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años sin título de graduado en ESO (3,4%), menor dato de nacimientos de madres menores de 20 años (0,0 ‰) y mayor superficie forestal (58,6%). Además, es la zona con menor tasa de desempleo (3,9%).

Resultados en salud. La Zona Básica de Salud de Auritz / Burguete se encuentra entre el 25,0% de zonas básicas con mejor resultado en lactancia materna exclusiva a los 6 meses (50,0%), en hombres diagnosticados de diabetes tipo 2 (7,8%) y en consumo de ansiolíticos y antidepresivos (13,3% en mujeres y 6,4% en hombres). Por otro lado, es de las zonas con peores resultados en exceso de peso en niños varones de 6 a 9 años (35,6%, dato calculado de manera conjunta con la ZBS de Aoiz / Agoitz).

Indicadores de encuesta. Los siguientes resultados ajustados* corresponden a la zona Navarra Atlántica-Pirineo (zonificación POT), a la que pertenece la zona básica de Burguete. Navarra Atlántica-Pirineo presenta el mejor resultado en consumo diario de frutas y verduras en mujeres (37,1%) y en consumo de tabaco diario en hombres (16,8%). Por el contrario, presenta los peores resultados en cuatro indicadores de encuesta para las mujeres: sedentarismo (32,1%), exceso de peso en personas de 15 o más años (44,0%), consumo de alcohol semanal (11,8%) y bajo bienestar general (35,2%).

***Nota:** Los indicadores de encuesta, y otros que así lo requieren, se han ajustado por sexo y edad para posibilitar la comparación entre zonas. Los indicadores brutos aparecen al pie de la siguiente página.

Auritz / Burguete

3. Resumen indicadores

La siguiente figura muestra, para una serie de indicadores, los valores de la zona (punto rojo) respecto a la media de Navarra (barra vertical) y respecto al conjunto de zonas básicas de Navarra. Para una descripción más detallada de los indicadores pueden consultarse sus fichas individuales, disponibles en la página web del Observatorio.

Grupo	Indicador	Periodo	Nº casos Zona	Valor Zona	Media Navarra	Peor	Mejor
Factores sociodemográficos y ambientales	1. Nacimientos de madres < 20 años	2021-2023	<5	0,0	1,1	4,0	0,0
	2. Jóvenes de 18-24 años sin título de graduado en ESO	2021	<5	3,4	6,0	13,0	1,2
	3. Tasa de desempleo	2023	-	3,9	9,6	17,1	3,9
	4. Tasa de riesgo de pobreza severa	2022	-	7,6	7,9	13,3	3,4
	5. Indice GINI	2022	-	30,2	31,0	39,5	23,8
	6. Hogares unipersonales de mujeres ≥ 80 años	2024	46	34,6	39,8	49,6	18,8
	7. Hogares unipersonales de hombres ≥ 80 años	2024	23	22,1	19,3	39,2	9,0
	8. Superficie forestal	2024	24875	58,6	34,0	0,0	67,7
Estilos de vida	9. Lactancia materna exclusiva a los 6 meses	2023	<5	50,0	35,4	15,2	66,7
	10. Consumo diario de frutas y verduras (M) #	2022	80	37,1	33,3	30,6	37,1
	11. Consumo diario de frutas y verduras (H) #	2022	52	25,7	25,5	24,5	28,0
	12. Sedentarismo (M) #	2022	68	32,1	26,0	32,1	22,3
	13. Sedentarismo (H) #	2022	46	22,8	19,4	25,4	16,4
	14. Consumo de alcohol semanal > 100 g (M) #	2021	14	11,8	8,6	11,8	5,1
	15. Consumo de alcohol semanal > 100 g (H) #	2021	37	24,4	23,6	25,0	21,9
	16. Consumo diario de tabaco (M) #	2022	29	13,8	13,1	14,4	12,9
	17. Consumo diario de tabaco (H) #	2022	26	16,8 *	22,4	24,9	16,8
Morbilidad	18. Bajo bienestar general (M) #	2021	35	35,2	30,1	35,2	21,3
	19. Bajo bienestar general (H) #	2021	20	16,9 *	23,0	34,2	16,7
	20. Exceso de peso ≥ 15 años (M) #	2022	48	44,0	34,8	44,0	32,3
	21. Exceso de peso ≥ 15 años (H) #	2022	78	56,3	59,8	66,9	54,8
	22. Exceso de peso infantil 6-9 años (M)	2021-2023	40	30,9	29,2	40,7	18,4
	23. Exceso de peso infantil 6-9 años (H)	2021-2023	52	35,6	30,2	37,2	17,9
	24. Prevalencia de personas diagnosticadas de diabetes tipo 2 (M)	2023	54	4,8	6,2	7,6	3,2
	25. Prevalencia de personas diagnosticadas de diabetes tipo 2 (H)	2023	93	7,8	8,8	11,7	6,4
	26. Pacientes ≥ 3 patologías crónicas > 64 años (M)	2023	45	6,5	7,8	8,7	3,5
	27. Pacientes ≥ 3 patologías crónicas > 64 años (H)	2023	65	12,1	12,2	16,4	6,0
	28. Consumo de ansioliticos y antidepresivos (M)	2023	179	13,3	17,8	20,3	11,3
	29. Consumo de ansioliticos y antidepresivos (H)	2023	91	6,4 *	8,7	11,0	5,9
Sistema de salud	30. Personas diabéticas con medición de HbA1c	2023	116	81,1	78,6	60,5	97,6
	31. Personas hipertensas con medición de TA	2023	212	60,2	55,2	33,5	86,4

Fuente de indicadores: 1: Mov. Natural Población; 2, 6-7: SIPNa; 3: Estad. Municipal de Pob. Activa; 4-5: Estad. Renta; 8: SIGPAC; 9, 24-27, 30-31: Atención Primaria; 10-21: ESyCV; 22-23: ISPLN; 28-29: Prestación Farmacéutica

Indicadores de la zona Pirineo (10-21) según Zonificación POT (NASTAT). Número de valores representados en la figura: 4.

***** Significativamente diferentes (p < 0,05) al resultado de Navarra (contraste realizado para indicadores de estilos de vida, morbilidad y sistema de salud).

1. Tasa promedio anual específica de fecundidad (‰) de mujeres 14-19 años; **2.** % de jóvenes de 18-24 años sin título de graduado en ESO o equivalentes; **3**. % de parados respecto a la población activa; **4.** % de personas que viven en hogares cuya renta total equivalente está por debajo del umbral de pobreza severa; **5** Índice Gini de desigualdad de ingresos representando mayor igualdad un dato más bajo; **6 y 7.** % de personas ≥ 80 años que residen solas en relación al total de residentes de esta edad en viviendas familiares; **8.** % de superficie forestal; **9.** % bebés con lactancia materna exclusiva a los 170-190 días; **10 y 11.** % ajustado de personas ≥ 15 años que consume diariamente frutas y verduras (T. bruta: mujeres 38,9 y hombres 25); **12 y 13.** % ajustado de personas ≥ 15 años sedentarias: declaran no hacer ejercicio (T. bruta: mujeres 31,5 y hombres 23,1); **14 y 15.** % ajustado de personas ≥ 15 años que consumen >100 g de alcohol a la semana (T. bruta: mujeres 10,8 y hombres 24,9); **16 y 17.** % ajustado de personas ≥ 15 años que consumen tabaco a diario (T. bruta: mujeres 12,9 y hombres 15,3); **18 y 19.** % ajustado de personas ≥ 15 años que presentan un bajo bienestar general (T. bruta: mujeres 33,3 y hombres 17,2); **20 y 21.** % ajustado de personas ≥ 15 años con exceso de peso: sobrepeso u obesidad (T. bruta: mujeres 45,4 y hombres 58,4); **22 y 23.** Prevalencia ajustada de exceso de peso – sobrepeso u obesidad – en población infantil de 6-9 años, definido según patrones de crecimiento infantil OMS (T. bruta: mujeres 30,8 y hombres 37,4); **24 y 25.** Prevalencia ajustada de personas ≥ 20 años con diabetes tipo 2 (T. bruta: mujeres 6,9 y hombres 10,9); **26 y 27.** % ajustado de personas ≥ 65 años con ≥ 3 patologías (T. bruta: mujeres 11,1 y hombres 14,7); **28 y 29.** % ajustado de personas con consumo de ≥ 3 envases en el último año de alguno de estos grupos: N50B ansiolíticos, N05C hipnóticos y sedantes y/o N06A antidepresivos (T. bruta: mujeres 19,8 y hombres 9); **30.** % de población > 14 años con diabetes tipo 2 que tiene medición de hemoglobina glicosilada (HbA1c) en el último año; **31.** % de población > 14 años con diagnóstico de hipertensión que tienen medición de la tensión arterial (TA) en el último año.