Estrategia de vacunación

Rueda de prensa

9 abril 2021

Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra
Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

ESTRATEGIA NAVARRA DE VACUNACIÓN FRENTE AL COVID-19

ACTUALIZACIÓN **5**

ESTAMOS AQUÍ

PRIMERAS DOSIS DISPONIBLES | MÁS DOSIS DISPONIBLES | AMPLIA DISPONIBILIDAD

VACUNAS ARN

Cominarty: >18 años
Moderna: >16 años

* Sin limite de edad

+ Vulnerabilidad
+
+ Exposición

1 SOCIOSANITARIOS
(residencias, otros centros...)

2 SANITARIOS
primera línea

RED PÚBLICA | RED PRIVADA

3a OTROS SANITARIOS
Gabinetes dentales
Otros

4 GRANDES DEPENDIENTES
rurales / urbanos

5 PERSONAS VULNERABLES POR EDAD
no residentes en centros de mayores

- 5a ≥ 80 años
- 5b 70 - 79 años
- 5c 66 - 69 años

7 PERSONAS CON CONDICIONES DE ALTO RIESGO de enfermedad grave de Covid
(transplantadas, pacientes oncológicos, diálisis, Síndrome Down...)

ASTRA-ZÉNECA

Menor exposición

*(*Pendiente de actualización técnica)*

3b OTROS PROFESIONALES SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS
Centros sanitarios, fisioterapeutas, logopedas, podólogos, terapeutas, psicólogos, protésicos dentales, estudiantes sanitarios y sociosanitarios en prácticas... | Cuidadores

3c RESTO DE PERSONAL SANITARIO Y SOCIOSANITARIO NO VACUNADO

6 COLECTIVOS CON FUNCIÓN ESENCIAL

- 6a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias...
- 6b Docentes y personal de Educación infantil y Especial
- 6c Docentes y personal de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria

8 56 - 65 AÑOS

9 46 - 55 AÑOS

OTRAS VACUNAS

En trámite de autorización y pendientes de calendarizar

Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra
Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Datos analizados por el Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo (PRAC)

- En el Espacio Económico Europeo (EEE) y Reino Unido, se han identificado hasta el 22 de marzo, 62 casos de TSVC y 22 de trombosis de venas esplácnicas, de los cuales 18 fallecieron. Hasta esa fecha, 25 millones de personas habían recibido esta vacuna.
- Con esta información:
  - Por el momento no se han identificado factores de riesgo específicos para su aparición.
  - Un posible mecanismo que podría explicar estas reacciones adversas sería de tipo inmunológico, similar al conocido para la trombocitopenia inducida por heparina
  - Se han requerido nuevos estudios y se continuará analizando este riesgo.

Conclusiones del PRAC

- Tras la evaluación de los datos disponibles sobre los casos notificados de trombosis tras la vacunación con Vaxzevria (vacuna frente a la COVID 19 de AstraZeneca), el PRAC ha concluido lo siguiente:
  - Tras la administración de Vaxzevria pueden aparecer, muy raramente, **trombosis en combinación con trombopenia** , como trombosis de senos venosos cerebrales (TSVC), en abdomen (trombosis de venas esplácnicas) y trombosis arterial
  - Los casos identificados se han presentado mayoritariamente en mujeres de menos de 60 años de edad en las dos semanas posteriores a la administración de la vacuna.
  - No se han identificado factores de riesgo específicos para su aparición
  - Se recomienda a profesionales sanitarios y ciudadanos vigilar la posible aparición de signos y síntomas de trombosis y trombocitopenia para su diagnóstico y tratamiento precoz

Información para sanitarios y ciudadanía

- Se recomienda vigilar la posible aparición de signos y síntomas entre los 4 y 14 días de la vacunación:
  - Dolor de cabeza intenso o persistente, visión borrosa, confusión o convulsiones
  - Dificultad para respirar, dolor en el pecho, hinchazón de las piernas o dolor abdominal persistente,
  - Múltiples hematomas pequeños, manchas rojizas o violáceas en la piel.
- Informar a la ciudadaníasobre estos signos y síntomas por los que deben buscar asistencia médica inmediata

Datos del Reino Unido

- Hasta el 31 de marzo de 2021 inclusive con 20,2 millones de dosis de la vacuna COVID-19 AstraZeneca en el Reino Unido:
  - 79 casos de coagulación sanguínea junto con niveles bajos de plaquetas : 44 fueron de TSVC y 35 trombosis en otras venas principales, todas con trombocitopenia
  - 51 mujeres y 28 hombres, de 18 a 79 años (se han vacunado más mujeres con la vacuna AstraZeneca que hombres).
  - 19 personas han muerto de los 79 casos: 13 mujeres y 6 hombres
    - 11 de las 19 personas que murieron eran menores de 50 años
    - 3 de las cuales tenían menos de 30.
  - Los 79 casos ocurrieron después de la 1ª dosis de la vacuna. (4/1.000.000)

University of Cambrigde

Weighing up the potential benefits and harms of the Astra-Zeneca COVID-19 vaccine

For 100,000 people with low exposure risk*

Potential benefits: ICU admissions due to COVID-19 prevented **every 16 weeks:**	Age group	Potential harms: Serious harms due to the vaccine:
0.8	20-29yr	1.1
2.7	30-39yr	0.8
5.7	40-49yr	0.5
10.5	50-59yr	0.4
14.1	60-69yr	0.2

* Based on coronavirus incidence of 2 per 10,000: roughly UK in March

En Navarra

- Los beneficios superan a los riesgos
- Si en Navarra hubiéramos vacunado a toda la población > 18 años con A/Z
  - 2 casos de trombosis con trombopenia
  - 1 o ningún fallecido
- Desde el 1/01/2021:
  - 888 hospitalizados
  - 125 ingresados en UCI
  - 145 fallecidos por COVID-19

ESTRATEGIA NAVARRA DE VACUNACIÓN

PREVISION ACTUALIZACION 6
TRAS DECISIONES SOBRE ASTRA ZENECA

ESTAMOS AQUÍ

PRIMERAS DOSIS DISPONIBLES | MÁS DOSIS DISPONIBLES | AMPLIA DISPONIBILIDAD

VACUNAS ARN

Cominarty: >18 años
Moderna: >16 años

* Sin limite de edad

+ Vulnerabilidad
+
+ Exposición

1 SOCIOSANITARIOS
(residencias, otros centros...)

2 SANITARIOS
primera línea

RED PÚBLICA | RED PRIVADA

3a OTROS SANITARIOS
Gabinetes dentales
Otros

4 GRANDES DEPENDIENTES
rurales / urbanos

5 PERSONAS VULNERABLES POR EDAD
no residentes en centros de mayores

- 5a ≥ 80 años
- 5b 70 - 79 años

7 PERSONAS CON CONDICIONES DE ALTO RIESGO de enfermedad grave de Covid
(transplantadas, pacientes oncológicos, diálisis, Síndrome Down...)

ASTRA-ZÉNECA

3b OTROS PROFESIONALES SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS ≥ 60 años
Centros sanitarios, fisioterapeutas, logopedas, podólogos, terapeutas, psicólogos, protésicos dentales, estudiantes sanitarios y sociosanitarios en prácticas... | Cuidadores

3c RESTO DE PERSONAL SANITARIO Y SOCIOSANITARIO NO VACUNADO ≥ 60 años

6 COLECTIVOS FUNCIÓN ESENCIAL ≥ 60 años

- 6a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias...
- 6b Docentes y personal de Educación infantil y Especial
- 6c Docentes y personal de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria

60 - 65 AÑOS

66 - 69 AÑOS

VACUNAS EN FUNCION DE EDAD Y DISPONIBILIDAD

3b OTROS PROFESIONALES SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS < 60 años

3c RESTO PERSONAL SANITARIO Y SOCIO-SANITARIO < 60 años

6 COLECTIVOS F. ESENCIAL < 60 años

46 - 59 AÑOS

Los números Xx corresponden a la denominación de los diferentes grupos en la Estrategia de vacunación frente a Covid-19 / Indica posible solapamiento temporal

Gobierno de Navarra | Nafarroako Gobernua

AGENDA 2030

Grupo 7. Condiciones alto riesgo

Condiciones de alto riesgo
Trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH)- alo y autotrasplante- en los últimos 2 años, o >50 años y/o < 80% de índice Karnofsky, independientemente del tiempo desde el TPH.
Trasplante de órgano sólido y en lista de espera para trasplante de órgano sólido[18,19,20,21,22] • Trasplante pulmonar. • Trasplante renal y pancreático. • Trasplante cardíaco. • Trasplante hepático. • Trasplante intestinal.
Tratamiento sustitutivo renal[17,23,24,25,26] (hemodiálisis y diálisis peritoneal).
Enfermedad oncohematológica[27] en los últimos 5 años o no controlada y/o ECOC 3-4 y/o neutropenia severa (< 500 neutrófilos/mm^3) independientemente del tiempo desde el diagnóstico.
Cáncer de órgano sólido[28,29,30,31]: • Cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica. • Cáncer de órgano sólido metastásico. • Pacientes que reciben radioterapia por tumores de localización torácica con riesgo de neumonitis (tumor esófago, radioterapia sobre metástasis pulmonares, etc).
Inmunodeficiencias primarias[32,33]. Todas las inmunodeficiencias primarias, excluyendo el déficit de IgA y el defecto de formación de anticuerpos.
Infección con VIH y con <200 cel/ml (analítica de los últimos 6 meses)[34,35,36,37,38]
Síndrome de Down con 40 o más años de edad (nacidos en 1981 o antes)[39,40]

Población navarra según INE

Poblacion Navarra según INE	Nº
≥80 años	41.166
70-79 años	55.792
60-69 años	73.844
50-59 años	96.694
25-49 años	223.028
18-24 años	48.505
16-17 años	13.906
16 y más años	552.935

Cobertura vacunal a fecha 8 abril

- 172.555 dosis recibidas
- 141.450 dosis administradas
  - 95.796 primeras dosis
  - 45. 654 segundas dosis
- 17,3% de la población susceptible vacunar tiene primera dosis y 8,2% tiene las dos dosis.

Cobertura población con al menos 1 dosis administrada



Cobertura población con vacunación completa