Tularemia

Descripción

En el norte de la Comunidad Foral de Navarra se han detectado recientemente dos casos de **tularemia en personas**, lo que nos hace pensar que es posible que el patógeno esté circulando también entre la fauna silvestre.

La tularemia es una enfermedad causada por la bacteria *Francisella tularensis* y tiene como **principales reservorios los lagomorfos (conejos y liebres) y los roedores**, aunque también afecta en menor medida a otras especies de aves, mamíferos y anfibios.

En el medio natural pueden producirse brotes esporádicos de elevadas mortalidades en estas especies, asociados a plagas de topillos y/o altas densidades de liebre. Puede haber animales infectados **con o sin lesiones aparentes**, que además son inespecíficas (punteado blanquecino en hígado y bazo, aumento del tamaño del bazo o alteraciones en la consistencia de los pulmones).



Transmisión

Se puede transmitir al ser humano por **contacto directo con el animal enfermo o muerto** (a través de la piel o mucosas durante la manipulación del animal), por la **picadura** de artrópodos hematófagos (principalmente **garrapatas** pero también otros insectos) o, en menor medida, por la ingestión de agua o carne infectadas o por la inhalación de polvo en zonas contaminadas. No se ha descrito la transmisión entre personas y tiene tratamiento.

Según la vía de contagio se pueden presentar **cuadros clínicos diferentes**. Los síntomas más habituales son fiebre alta, malestar general y lesiones en dedos o ganglios axilares (a veces ulceradas).

Recomendaciones

- Uso de **guantes y mascarilla** al manipular estos animales. Llevar especial cuidado en el eviscerado ya que los fluidos del animal pueden entrar en contacto con pequeñas heridas en las manos.
- **Desechado de piel y vísceras** a la basura doméstica (no hay que verterlas en el medio natural o dárselas a los perros).
- **Consumo de carne bien cocinada** (la congelación no inactiva la bacteria).
- **Evitar la ingestión de agua no controlada sanitariamente**.
- Si se observa una **garrapata fijada**, acudir a su centro sanitario.



Si observa una mortalidad anormalmente elevada de roedores o lagomorfos (conejos o liebres), contacte con la autoridad de caza o sanidad animal.

Ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad (fiebre, hinchazón de ganglios, úlceras cutáneas,…**), póngase en contacto con su médico lo antes posible.**

Octubre 2021

Nafarroako Ingurumen Kudeaketa, S.A. Gestión Ambiental de Navarra, S.A.

Gobierno de Navarra
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Nafarroako Gobernua
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua