

Grupo	Vacunación	
	Gripe	Covid-19
Personas de 60 y más años de edad	Sí	No
Personas de 70 y más años de edad	Sí	S
Población infantil entre 6 y 59 meses de edad	Sí	No
Personas de 5 años o más internadas en centros de discapacidad, residencias de mayores y residentes en instituciones cerradas	Sí	Sí
Personas (> 6 meses) con especial vulnerabilidad: inmunosupresión (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por la infección por VIH o por fármacos, así como en los receptores de trasplantes, CAR-T y déficit de complemento).	Sí	Sí
Personas a partir de 12 años de edad pertenecientes a grupos de riesgo o con inmunosupresión grave:		
- diabetes mellitus y síndrome de Cushing.	Sí	Sólo diabetes
- obesidad mórbida (IMC \geq 40 en adultos, \geq 35 en adolescentes, o \geq 3 desviaciones estándar en la infancia).	Sí	Sí
- enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, incluyendo displasia bronco-pulmonar, fibrosis quística y asma.	Sí	Sí, además, de la HTA con afectación cardíaca
- enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico	Sí	Enfermedad renal, estadios 3, 4 y 5
- hemoglobinopatías y anemias o hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples.	Sí	Sí
- asplenia o disfunción esplénica grave.	Sí	No
- enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo crónico	Sí	Sólo enfermedad hepática crónica
- enfermedades neuromusculares graves.	Sí	Sí
- Cáncer y hemopatías malignas.	Sí	Sí
- Trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras.	Sí	Sí
- Enfermedad inflamatoria crónica		
- Fístula de líquido cefalorraquídeo e implante coclear o en espera del mismo.	Sí	No
- Personas con enfermedad celíaca		
- Personas fumadoras.		
Personas de 5-18 años de edad que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe.	Sí	No
Embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo).	Sí	Sólo embarazadas
Personas convivientes con aquellas que tienen alto grado de inmunosupresión: en general se refiere a aquellas con trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de órgano sólido, insuficiencia renal crónica, infección por VIH con bajo recuento de CD4 (<200 cel/ml), algunas inmunodeficiencias primarias y sometidas a ciertas terapias inmunosupresoras.	Sí	Voluntario
Personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados	Sí	Voluntario

Grupo	Vacunación	
	Gripe	Covid-19
Personas que trabajan en servicios públicos esenciales, con especial énfasis en los siguientes subgrupos: <ul style="list-style-type: none"> - Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con dependencia nacional, autonómica o local, así como las Fuerzas Armadas. - Bomberos. - Servicios de protección civil. 	Sí	No
Estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios	Sí	No
Personal de centros de guarderías y educación infantil (centros 0-5).	Sí	No
Personas con exposición laboral directa a animales o a sus secreciones en granjas o explotaciones avícolas, porcinas o de visones o a fauna silvestre (aves, jabalíes o mustélidos), como ganaderos, veterinarios, trabajadores de granjas, cazadores, ornitólogos, agentes de medioambiente, personal de zoológicos, etc. La finalidad es reducir la oportunidad de una infección concomitante de virus humano y aviar o porcino, disminuyendo la posibilidad de recombinación o intercambio genético entre ambos virus.	Sí	No