

Examen de TEST. Oposición Odontólogo. SNS-O. 27/03/2021

- 1) En los siguientes trastornos cardíacos, hay uno donde no se recomienda la profilaxis antibiótica en odontología:
 - a) Endocarditis bacteriana previa.
 - b) Cirugía previa de bypass coronario.
 - c) Válvula cardíaca protésica.
 - d) Cardiopatía congénita cianótica no corregida.

- 2) En cuál de los siguientes procedimientos dentales no se recomienda la profilaxis antibiótica:
 - a) Extracciones dentales.
 - b) Pérdida de dientes temporales.
 - c) Remoción de puntos de sutura.
 - d) Instrumentación endodóntica.

- 3) ¿Si queremos hacer un estudio por imagen de un posible quiste radicular en el 1.2 qué prueba o pruebas realizaría?:
 - a) Ortopantomografía y radiografía periapical.
 - b) Ortopantomografía.
 - c) Resonancia Magnética
 - d) Ninguna es cierta.

- 4) Para realizar exodoncias en un paciente que ha sido irradiado en la zona de cabeza y cuello:
 - a) Debemos esperar 1 mes después de que haya terminado la Radioterapia.
 - b) Usaremos el protocolo de tocoferol y pentoxifilina.
 - c) Hay que esperar 2 años para poder hacer las extracciones.
 - d) Hoy día, con la Radioterapia de Intensidad Modulada, no hay ningún problema y se pueden extraer los dientes inmediatamente.

- 5) ¿Para el liquen plano oral, qué tratamientos no se recomiendan para empezar?:
 - a) Inhibidores de la calcineurina.
 - b) Retinoides tópicos.
 - c) Irradiación ultravioleta (PUVA).
 - d) Todas son ciertas.

- 6) En el caso de pacientes adultos alérgicos a la penicilina, el antibiótico de elección en la profilaxis de pacientes cardiopatas sería:
 - a) Ceftriaxona 1 gr. IM 30/60 minutos antes del procedimiento.
 - b) Clindamicina 600 mg 30/60 minutos antes del procedimiento.
 - c) Azitromicina 500 mg.
 - d) b y c son correctas.

Examen de TEST. Oposición Odontólogo. SNS-O. 27/03/2021

- 7) De entre los siguientes antibióticos y durante el primer trimestre uno está contraindicado:
- Metronidazol.
 - Penicilina y derivados.
 - Estreptomina.
 - Eritromicina.
- 8) Criterios inclusión Programa Asistencia Dental a Personas con Discapacidad en Navarra. Señale la falsa:
- Estarían incluidos todos los residentes en Navarra que tuvieran reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 75% según el departamento correspondiente del Gobierno de Navarra.
 - En personas de 18 años o más tener reconocida la asistencia de terceras personas.
 - Cumplir los criterios de riesgo oral que determine la Sección de Salud Bucodental del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea.
 - En personas menores de 18 años, tener reconocida la situación de dependencia en cualquiera de sus grados.
- 9)Cuál de los siguientes tumores no odontogénicos es un trastorno de células plasmáticas:
- Mieloma.
 - Mieloma múltiple.
 - Plasmocitoma.
 - Todos los anteriores.
- 10) ¿Cuál es la concentración de flúor aconsejable en el dentífrico según la edad?:
- De 0 a 3 años dentífrico con concentración de flúor de 1000 ppm. Utilizando la cantidad de un grano de arroz.
 - De 3 a 5 años uso de dentífrico con concentración de flúor de 1000 ppm. Utilizando la cantidad de un guisante.
 - A partir de los 6 años dentífrico con 1450 ppm de flúor.
 - Todas son ciertas.
- 11) El tumor epitelial más frecuente en la cavidad oral es:
- Papiloma.
 - Fibroma.
 - Hemangioma.
 - Nevus.
- 12) Para el diagnóstico del dolor miofascial por puntos gatillo son criterios mayores todos los siguientes menos uno, diga cuál es:
- Palpación de bandas musculares tensas.
 - Alivio del dolor mediante estiramiento o infiltración.
 - Limitación de movimientos.
 - Dolor espontáneo localizado.

Examen de TEST. Oposición Odontólogo. SNS-O. 27/03/2021

- 13) En el cuadro clínico de la histiocitosis X o enfermedad de células de Langerhans se distinguen varias agrupaciones de síndromes, señale la respuesta falsa:
- La forma aguda focal.
 - La forma aguda diseminada.
 - La forma crónica diseminada.
 - La forma crónica focal.
- 14) En pacientes con síndrome de Sjögren primario debemos de vigilar:
- La glándula sublingual para prevenir el tumor de Küttner.
 - La glándula parótida para prevenir el linfoma no-Hodgkin tipo B.
 - La glándula parótida para prevenir el tumor de Warthin.
 - Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
- 15) ¿Por qué podríamos distinguir nosotros un síndrome de Cowden?:
- Por la presencia de múltiples papilomas orales.
 - Por la presencia de múltiples nevus basocelulares.
 - Por la característica agenesia de caninos mandibulares.
 - Por el alargamiento del tiempo de protrombina junto con una disminución del número de plaquetas.
- 16) En un paciente que toma apixabán y le hemos de hacer una exodoncia quirúrgica de un cordal semiincluido y horizontalizado:
- Necesitaremos un INR igual o menor a 3.
 - Lo tendrá que dejar de tomar una semana antes.
 - No nos afecta esta medicación en absoluto.
 - Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
- 17) ¿En un paciente adulto, cuál es la principal indicación de la radiografía oclusal inferior?:
- Valorar el tamaño de los torus mandibulares linguales.
 - Valorar la linguoversión de los dientes para el tratamiento ortodóncico.
 - Verificar la presencia de sialolitos en los conductos de Stensen.
 - Ninguna de las anteriores es cierta.
- 18) Una de las siguientes afirmaciones respecto al quiste radicular es falsa, señale cuál es:
- El quiste, una vez formado, crece por proliferación del epitelio.
 - Estos quistes derivan de los restos epiteliales de Malassez.
 - Se desarrollan casi exclusivamente en la dentición permanente.
 - Ninguna es cierta.
- 19) La displasia cleidocraneal se caracteriza por:
- Retraso en la erupción de los dientes permanentes.
 - Hipoplasia clavicular.
 - Presencia de dientes supernumerarios.
 - Todas las respuestas anteriores son ciertas.

Examen de TEST. Oposición Odontólogo. SNS-O. 27/03/2021

- 20) En una radiografía transcraneal de la ATM, lo que vemos como parte superior del cóndilo mandibular corresponde a:
- La zona lateral de la cara superior del cóndilo mandibular.
 - La cara superior del cóndilo mandibular.
 - El polo medial del cóndilo mandibular.
 - Todas son falsas.
- 21) ¿Cuál es la complicación más grave de la enfermedad de Paget?:
- El aumento de la incidencia de sarcoma.
 - La parálisis generalizada.
 - Las múltiples fracturas.
 - El aumento de la presión intracraneal.
- 22) La prevención primaria en el cáncer oral consiste en:
- Dejar de fumar.
 - Diagnóstico precoz.
 - Prevenir la aparición de metástasis.
 - a y b son correctas.
- 23) La resonancia magnética, en la patología de la ATM, tiene como ventaja sobre otras técnicas de diagnóstico por imagen:
- Es un método no invasivo
 - Es de elección para valorar el desplazamiento del disco articular.
 - Permite obtener imágenes en los tres planos del espacio.
 - Las tres respuestas anteriores son correctas.
- 24) ¿Cuál es la diferencia entre una TC y una TCHC?:
- Una requiere sedación y la otra no.
 - Por el tipo de haz de los rayos X.
 - Porque la TCHC no irradia.
 - Ninguna es cierta.
- 25) En la clasificación de Pell y Gregory para los cordales:
- Hay 4 clases y 4 posiciones.
 - La clase 4 posición A indica nivel de dificultad mínimo.
 - La clase III posición C es la de mayor nivel de complejidad.
 - Ninguna es cierta.
- 26) El músculo geniogloso está innervado por:
- El nervio hipogloso.
 - El XI par craneal.
 - El nervio glossofaríngeo.
 - El X par craneal

- 27) La arteria dentaria inferior es rama de:
- Arteria lingual.
 - Arteria maxilar interna.
 - Arteria facial.
 - Ninguna es cierta.
- 28) El molusco contagioso está asociado con infección por virus:
- Grupo de la viruela.
 - Papilomavirus.
 - Retrovirus.
 - Herpes virus.
- 29) El hueso maxilar superior articula con la mandíbula mediante:
- Una trocoide.
 - Una articulación en silla de montar.
 - Necesita un disco articular intermedio.
 - Ninguna es cierta.
- 30) Criterios indicaciones sellado segundos molares:
- Cuando haya un CAOD >1.
 - Cuando haya habido un cod >2.
 - Que hayan erupcionado hace menos de 5 años.
 - Todas son correctas.
- 31) Entre los quistes del desarrollo no odontogénicos, no se incluyen:
- Quistes del conducto nasopalatino.
 - El quiste residual.
 - Quiste nasolabial.
 - Ninguna de las anteriores.
- 32) Uno de los siguientes signos, no es característico de la cefalea en racimos:
- Afecta a personas de edad avanzada.
 - Se producen 1-3 crisis diarias.
 - Carácter urente y lancinante.
 - Ninguna de las anteriores.
- 33) Tras la intervención de un tercer molar inferior puede aparecer el flemón de Escat caracterizado por:
- Ausencia de tumefacción externa.
 - Trismo intenso.
 - Afectación del espacio pterigomandibular.
 - Todas son ciertas.

Examen de TEST. Oposición Odontólogo. SNS-O. 27/03/2021

- 34) Si queremos recetar el tratamiento tópico más potente para el liquen plano oral, recetaremos:
- Solución acuosa de acetónido de fluocinolona al 0,5%.
 - Solución acuosa de acetónido de triamcinolona al 0,1%.
 - Solución acuosa de propionato de clobetasol al 5%.
 - Ninguna es cierta.
- 35) Las características del dolor neurógeno orofacial comprenden:
- Afectación el sistema nervioso (conducción nerviosa defectuosa).
 - Localización en el territorio de inervación de la rama nerviosa afecta.
 - a y b son ciertas.
 - Evolución aguda.
- 36) Debemos pensar en las neuralgias trigeminales secundarias:
- Existen anomalías en la exploración clínica.
 - La afectación es bilateral.
 - a y b son ciertas.
 - Todas son falsas.
- 37) De entre las siguientes afirmaciones de los tumores de glándulas salivales, señale la correcta:
- El 80% asientan en la glándula submaxilar.
 - La mayoría de los tumores de la glándula sublingual son benignos.
 - a y b son ciertos.
 - a y b son falsos.
- 38) Cuando hablamos de hiperqueratosis, nos referimos a:
- Una alteración que nunca se da en boca.
 - Un aumento de espesor de la capa córnea.
 - Un aumento de espesor del estrato espinoso.
 - Ninguna de las anteriores es cierta.
- 39) En la leucoplasia, consideramos signos de mal pronóstico:
- Localización en superficie ventral de la lengua y suelo de boca.
 - Las formas moteadas o nodulares.
 - La presencia de signos displásicos en el epitelio.
 - Todas las anteriores son ciertas.
- 40) En referencias al ácido alendrónico:
- Se ha utilizado en el tratamiento de la osteoporosis.
 - Puede producir osteonecrosis de los maxilares.
 - El efecto secundario más frecuente es la esofagitis.
 - Todas son ciertas.

Examen de TEST. Oposición Odontólogo. SNS-O. 27/03/2021

- 41) ¿Cuál de los siguientes fármacos, consumidos durante mucho tiempo, pueden producir hiperplasia gingival?:
- a) Fenitoína.
 - b) Ciclosporina.
 - c) Nifedipino.
 - d) Todos los anteriores.
- 42) En el tratamiento de la osteonecrosis por bifosfonatos:
- a) El desbridamiento de heridas o decorticación ósea es prioritario.
 - b) El tratamiento antibiótico es una de las medidas más efectivas.
 - c) Los niveles séricos de CTX son de un valor predictivo determinante.
 - d) Todas las anteriores son falsas.
- 43) En cuanto a las lesiones mucosas inducidas por radiación (mucositis):
- a) Las reacciones tempranas aparecen al final de la primera semana.
 - b) Las superficies queratinizadas son las que con más frecuencia se afectan.
 - c) Las manifestaciones tardías si aparecen son siempre reversibles.
 - d) Ninguna de las anteriores es cierta.
- 44) La gingivoestomatitis herpética primaria:
- a) Su causa es el VHS-2.
 - b) Es la infección vírica aguda más frecuente de la mucosa yugal.
 - c) Afecta de manera preferente a los adultos.
 - d) Aparte de las lesiones en mucosas, es asintomática.
- 45) La hiperplasia epitelial focal:
- a) Es una lesión precancerosa.
 - b) Los agentes causales son los virus del papiloma humano.
 - c) Clínicamente se caracteriza por la aparición de lesiones dolorosas en mucosas yugales.
 - d) El tratamiento de elección consiste en la extirpación de las lesiones.
- 46) Los efectos secundarios de la clorhexidina incluyen:
- a) Alteraciones del gusto.
 - b) Incremento en la formación de cálculo.
 - c) Parotiditis.
 - d) Todas las anteriores.
- 47) En cuanto al penfigoide cicatricial:
- a) Evoluciona con la aparición de ampollas intraepiteliales.
 - b) Con frecuencia aparece como una gingivitis descamativa.
 - c) Las lesiones oculares pueden producir ceguera.
 - d) b y c son ciertas.

- 48) El tumor de Pindborg (JJ Pindborg) consiste en:
- Un mixoma odontogénico.
 - Un tumor odontogénico adenomatoide.
 - Un tumor odontogénico epitelial calcificante.
 - Ninguno de los anteriores.
- 49) En la luxación condilomeniscal moderada:
- Siempre desaparece el clic recíproco.
 - La deflexión mandibular no aparece nunca.
 - La palpación articula siempre es negativa.
 - Ninguna de las anteriores.
- 50) Ante un paciente con discapacidad visual usaremos la técnica:
- Enseñar – decir – hacer.
 - Decir – tocar – oler – hacer.
 - Decir – tocar – hacer.
 - Oler – hacer.
- 51) Por el ojal retrocondíleo de Juvara atraviesan:
- El nervio temporo bucal.
 - El nervio temporo maseterino.
 - El nervio periestafilino externo.
 - Ninguno de los anteriores.
- 52) En cuanto a la mononucleosis infecciosa:
- El signo más consistente, es la linfadenopatía.
 - Las petequias palatinas, son el signo oral más sobresaliente.
 - Raramente afecta a los adultos jóvenes.
 - a y b son ciertas.
- 53) En lo referente a la sarcoidosis, señale la respuesta correcta:
- No está alterada la inmunidad tardía de tipo celular.
 - Las manifestaciones bucales son frecuentes.
 - Los pulmones resultan afectados con frecuencia.
 - Ninguna de las anteriores.
- 54) En el fenómeno de acantolisis señale cual es la correcta:
- Se da de manera característica en el pénfigo cicatricial.
 - Afecta al estrato espinoso.
 - La alteración se localiza a nivel de los desmosomas.
 - b y c son ciertas.
- 55) En referencia a los quistes residuales, señale la respuesta correcta:
- Pueden presentar metaplasias.
 - Pueden experimentar transformación maligna.
 - Si lo hacen raramente ocasionan metástasis.
 - Todas ellas son correctas.

Examen de TEST. Oposición Odontólogo. SNS-O. 27/03/2021

- 56) En pacientes adultos con peso superior a 40 Kg. y cifras de aclaramiento de creatinina entre 30-50 ml/min. las dosis de amoxicilina/clavulánico deben de ser:
- a) 500 mg/125 mg dos veces al día.
 - b) 500 mg/125 mg una vez al día.
 - c) 500 mg/125 mg cada 24 horas.
 - d) No es necesario modificar la cantidad máxima recomendada de amoxicilina.
- 57) Criterios indicaciones sellado primeros molares según el PADI en Navarra. Señale la falsa:
- a) Índice CAOD >0.
 - b) Índice cod >1.
 - c) Que hayan erupcionado hace menos de 5 años.
 - d) En situaciones especiales de alto riesgo.
- 58) ¿Qué no incluye el Programa de Asistencia Dental a Discapacitados en Navarra?:
- a) Sellado de fisuras en dentición definitiva cuando la erupción se haya producido hace menos de 8 años.
 - b) Aplicación profesional de fluoruro tópico, con la técnica y periodicidad que estime necesario el facultativo.
 - c) Tratamientos de prótesis.
 - d) Ninguna de las anteriores está incluida.
- 59) En relación a los odontomas, señale la respuesta incorrecta:
- a) Son las lesiones tumorales de origen odontogénico más frecuentes.
 - b) Los odontomas complejos presentan órganos dentales definidos.
 - c) Los odontomas compuestos se suelen localizar en la región anterior del maxilar.
 - d) Con frecuencia se asocian a dientes retenidos.
- 60) En pacientes con estomatitis aftosa recidivante habría que pensar que pudieran padecer:
- a) Intolerancia al gluten.
 - b) Enfermedad de Crohn.
 - c) Enfermedad celíaca.
 - d) Todas son ciertas.
- 61) ¿Qué prestaciones estarían excluidas del PADI?:
- a) El tratamiento conservador de dientes deciduos en ausencia del permanente.
 - b) Exodoncia de cordales incluidos en cualquier posición.
 - c) El tratamiento de fracturas de dientes permanente con reposición protésica con coronas de porcelana.
 - d) b y c.

Examen de TEST. Oposición Odontólogo. SNS-O. 27/03/2021

- 62) ¿Cuál sería el tratamiento ante la avulsión de un incisivo central superior en un niño de 5 años?:
- a) Buscar el diente y cogerlo por la corona.
 - b) Lavar el diente con agua evitando tocar la raíz.
 - c) Reimplantar el diente y mantenerlo en su posición.
 - d) Ninguna de ellas.
- 63) ¿Cuál es el valor de saliva estimulada por debajo del que consideramos que existe un incremento en el riesgo de caries?:
- a) 0'7 ml/min.
 - b) 1'2 ml/min.
 - c) 2 ml/min.
 - d) 4 ml/min.
- 64) Según la OMS ¿cuál es la edad índice recomendada para valorar la evolución de caries en una comunidad?:
- a) 5 años.
 - b) 12 años.
 - c) 15 años.
 - d) 35-44 años.
- 65) ¿Cuál es el pH crítico en el que el esmalte inicia el proceso de desmineralización?:
- a) 3,5.
 - b) 4,5.
 - c) 5,5.
 - d) 6,5.
- 66) En cuanto a los mucocelos, señale la respuesta incorrecta:
- a) La localización más frecuente es en el labio inferior.
 - b) Los más frecuentes son por extravasación.
 - c) La ránula es un mucocelo por retención que surge de la glándula sublingual.
 - d) Los mucocelos por retención se desarrollan en los orificios de drenaje de las glándulas salivales mayores.
- 67) ¿Cuál de los siguientes es un síntoma de fluorosis leve? :
- a) Manchas tipo tiza en el esmalte.
 - b) Una opacidad blanca en más del 50% del diente.
 - c) Manchas oscuras en los dientes.
 - d) Esmalte marrón, quebradizo.
- 68) Acude un niño de 7 años que ha sufrido una avulsión en el 2.1. El tiempo total extraoral ha sido menor de una hora y se acompaña de fractura ósea. ¿Por cuánto tiempo le colocaremos una ferulización?:
- a) 7 días.
 - b) 10 días.
 - c) 2 semanas.
 - d) 4 semanas.

Examen de TEST. Oposición Odontólogo. SNS-O. 27/03/2021

- 69) En cuanto a la sensibilidad y especificidad de una prueba diagnóstica señale la respuesta incorrecta:
- a) Dependen de la prevalencia de la enfermedad.
 - b) Ambas son medidas de la validez de un test.
 - c) La sensibilidad mide la capacidad de la prueba para detectar enfermedad.
 - d) La especificidad es la probabilidad de que la prueba de negativo en personas sanas.
- 70) ¿Cuál de estas características no se presenta en el síndrome de Down?:
- a) Macroglosia.
 - b) Hipoplasia del esmalte y aumento de riesgo de caries.
 - c) Paladar ojival.
 - d) Mayor riesgo de gingivitis y enfermedad periodontal en edades tempranas.
- 71) La respuesta de los odontoblastos a los productos tóxicos de las bacterias produce:
- a) Dentina primaria.
 - b) Dentina secundaria.
 - c) Dentina terciaria.
 - d) Dentina cuaternaria.
- 72) En relación a la profilaxis antibiótica de la endocarditis bacteriana en niños señale la respuesta falsa:
- a) En pacientes con endocarditis infecciosa previa sí que estaría indicada.
 - b) Indicada en pacientes con prótesis valvulares.
 - c) En alérgicos a la penicilina con incapacidad para tomar medicación oral la dosis de clindamicina sería 40mg/kilo peso IM o IV.
 - d) También estaría indicada durante los seis meses siguientes a la reparación de defectos cardíacos congénitos.
- 73) La microflora del biofilm es similar entre:
- a) La superficie oclusal y la zona supra gingival del diente.
 - b) La superficie oclusal y las superficies interproximales.
 - c) Es diferente en todas las superficies.
 - d) Las superficies interproximales y la zona supra gingival del diente.
- 74) ¿Cuál es la opción de tratamiento en un diente permanente joven inmaduro, ante una pulpitis total irreversible?:
- a) Recubrimiento pulpar indirecto.
 - b) Apicoformación.
 - c) Recubrimiento pulpar directo.
 - d) Apicogénesis.

Examen de TEST. Oposición Odontólogo. SNS-O. 27/03/2021

- 75) Acude un niño de 14 años que ha sufrido una avulsión en el 2.1. El diente fue reimplantado de inmediato. ¿Por cuánto tiempo le colocaremos una ferulización?:
- a) 7 días.
 - b) 10 días.
 - c) 2 semanas.
 - d) 4 semanas.
- 76) ¿Cuál es el analgésico de elección en un paciente diabético?:
- a) Paracetamol.
 - b) Salicilatos.
 - c) Codeína.
 - d) a y c son ciertas.
- 77) De las siguientes ¿Cuál es la causa más frecuente de infección odontogénica del seno maxilar?:
- a) Periodontitis marginal.
 - b) Quiste de origen dentario.
 - c) Periodontitis apicales.
 - d) Dientes desplazados.
- 78) El síndrome de Melkersson-Rosenthal se caracteriza por:
- a) Edema de labio, parálisis facial y ptosis palpebral.
 - b) Tumefacción de los labios, lengua escrotal y parálisis facial.
 - c) Carcinoma de parótida, parálisis facial y lengua escrotal.
 - d) Lengua escrotal, ptosis palpebral y parálisis facial.
- 79) Uno de estos signos radiológicos puede aparecer en un paciente con insuficiencia renal crónica:
- a) Pérdida de la lámina dura que rodea el diente.
 - b) Patrón óseo trabecular fino.
 - c) Adelgazamiento de ambas corticales.
 - d) Todas las anteriores.
- 80) La línea alba bucal:
- a) Suele ser unilateral.
 - b) Se observa sobre todo en los bordes laterales de la lengua.
 - c) Coincide con el plano de Frankfort.
 - d) Es una variante de la normalidad.
- 81) ¿Cuál de los siguientes fármacos no es considerado esencial o de primera línea en la reanimación cardiopulmonar básica?:
- a) Oxígeno.
 - b) Diuréticos.
 - c) Bicarbonato sódico.
 - d) Adrenalina.

- 82) Criterios aplicación gel de flúor tópico en PADI Navarra. Señale la falsa:
- a) Entre 6 y 9 años con $\text{cod} \geq 6$ o $\text{CAOD} \geq 2$.
 - b) Entre 10 a 12 años $\text{CAOD} \geq 4$.
 - c) Entre 13 a 15 años $\text{CAOD} \geq 5$.
 - d) Se autorizarán un máximo de 3 aplicaciones tópicas de flúor por paciente y año.
- 83) La principal indicación de la artrocentesis de la ATM es:
- a) Bloqueo discal agudo que no responde a manipulación pasiva mandibular.
 - b) Bloqueo discal subagudo que no responde a manipulación mandibular.
 - c) Traumatismos de la ATM con dolor crónico persistente y capsulitis.
 - d) Artropatías inflamatorias con clínica dolorosa.
- 84) La escrófula no es más que la afectación de los ganglios linfáticos cervicales en el transcurso de:
- a) Sífilis.
 - b) Tuberculosis.
 - c) Lepra.
 - d) Actinomicosis.
- 85) La causa más frecuente de neuropatía trigeminal postraumática es:
- a) Extracción de restos radiculares incluidos.
 - b) Extracción de terceros molares inferiores incluidos.
 - c) Extirpación de sialolitos en la glándula sublingual.
 - d) Extracción de terceros molares superiores.
- 86) El absceso periodontal agudo se caracteriza por:
- a) No existe dolor.
 - b) No produce adenopatías.
 - c) Existe movilidad y extrusión del diente.
 - d) La percusión es negativa.
- 87) Ante un tratamiento dental en un paciente afecto de lupus eritematoso sistémico, es necesario considerar la posibilidad de que se pueda presentar:
- a) Hemorragia tras extracciones.
 - b) Shock por supresión suprarrenal.
 - c) Infecciones.
 - d) Todo lo anterior.
- 88) ¿Cuál es el factor del que depende la presentación de una osteorradionecrosis?:
- a) Dosis de irradiación.
 - b) Campo de irradiación.
 - c) Localización y estadio del tumor.
 - d) Todos los anteriores.

- 89) El mecanismo por el cual un hongo puede producir patología por su ingestión se denomina:
- a) Micetismo.
 - b) Micotoxicosis.
 - c) Micosis.
 - d) a, b y c son correctas.
- 90) ¿Cuál de estas características del síndrome de Pierre Robin es falsa?:
- a) Influencia hereditaria.
 - b) Fisura palatina.
 - c) Micrognacia mandibular.
 - d) Glosoptosis.
- 91) Con respecto a la queilitis actínica:
- a) Ocurre en igual proporción en el labio superior e inferior.
 - b) Es mas frecuente en la mujer.
 - c) Ocurre en edad temprana.
 - d) Se produce en personas con una tipología especial (piel clara, ojos claros).
- 92) El carcinoma de células acinares asienta con mayor frecuencia en las glándulas:
- a) Parótida.
 - b) Submandibular.
 - c) Sublingual.
 - d) Menores.
- 93) El herpes intraoral asienta con más frecuencia en:
- a) Mucosa masticatoria.
 - b) Mucosa yugal.
 - c) Lengua.
 - d) Mucosa labial.
- 94) Ante una glosodinia esencial, deberemos:
- a) Aplicar tratamiento antiinflamatorio.
 - b) Aplicar un tratamiento psicoterapéutico.
 - c) Toma de cultivo y antibiograma.
 - d) Biopsia sistemática.
- 95) Señale lo cierto respecto al granuloma piógeno:
- a) Se debe a una infección específica.
 - b) No suele sangrar.
 - c) El érpulis del embarazo es una forma de granuloma piógeno.
 - d) El tratamiento específico es antibioterapia.

- 96) El término melasma o cloasma indica la existencia de:
- a) Melanoma de la cavidad oral.
 - b) Melanomas multifocales.
 - c) Pigmentación de la región peribucal.
 - d) Ausencia de tubo digestivo.
- 97) En cuanto a la clínica del liquen plano oral, es correcto que:
- a) Las formas reticulares normalmente no se acompañan de síntomas.
 - b) Las formas atróficas y erosivas pueden dar dolor (exposición del corion).
 - c) En las lesiones cutáneas es frecuente el prurito.
 - d) Todas son correctas.
- 98) El tumor odontogénico mas frecuente es:
- a) Tumor odontogénico adenomatoide.
 - b) Ameloblastoma.
 - c) Tumor odontogénico calcificante.
 - d) Fibroma ameloblástico.
- 99) El riesgo de nacimientos prematuros es mayor cuando existe enfermedad periodontal en:
- a) Primer trimestre del embarazo.
 - b) Segundo trimestre del embarazo.
 - c) Tercer trimestre del embarazo.
 - d) Solo en las primeras seis semanas.
- 100) ¿Cuál sería la respuesta más correcta para el cálculo de las dosis de fármacos en niños?:
- a) A los 90 meses la mitad de dosis del adulto.
 - b) A partir de los 12 años la misma dosis.
 - c) Calcular la dosis en función de la superficie corporal del niño.
 - d) Calcular la dosis en función del peso.